

SCHEDA N° 0669 AMS_PD

ORDINE Entomatales

GENERE Entoloma	SPECIE hebes	AUTORE (Romagn.) Trimbach	
DATA DI RACCOLTA 28.11.2021	LUOGO DI RACC. Bosco Nordio	COMUNE S.Anna di Chioggia	PROV. VE
ALTITUDINE S.L.M. 1.5 m	I.G.M. 169-I	RACCOGLITORE Vitaliano Milanese	

HABITAT:

<input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI	<input type="checkbox"/> ORTIE GIARDINI	<input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA
<input type="checkbox"/> TERRENO NUDO	<input checked="" type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO	<input type="checkbox"/> ARENILE
<input type="checkbox"/> TORBIERA	<input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A	
<input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME	<input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO	<input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Leccio (prevalente), Pino, Robinia		<input checked="" type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO
<input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO	<input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO	<input type="checkbox"/> IN RADURE
<input type="checkbox"/> SU LEGNO	<input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO	DI

ESPOSIZIONE:

ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :

NOTE : Rinvenuti numerosi gruppetti di 4-5 esemplari ciascuno ai margini del sentiero.

MICROSCOPIA: Spore eterodiametriche, con 7-8 lati, 8.6-11.1 x 5.3-7.2 µ.

BIBLIOGRAFIA : NOORDELOOS M.E. – ENTOLOMA S.L. – ED. CANDUSSO

DETERMINATORE Vitaliano Milanese

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI

 <p>CARPOFORI</p>	 <p>SPORE</p>	 <p>BASIDI</p>
 <p>CHEILOCISTIDI</p>	 <p>EPICUTE</p>	

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Pileo da conico-convesso a piano, con papilla, di circa 3-3.5 cm di diametro nell'esemplare maggiore, igrofano, striato per trasparenza sino a metà raggio (tempo molto umido); cuticola liscia, di colore bruno carico (bruno-nerastro al centro), più pallido al margine.

Lamelle da adnate ad annesse con dentino, con numerose lamellule; di colore iniziale bianco sporco, quindi rosate, con filo eroso.

Stipite slanciato, cilindrico, con base leggermente allargata; concolore al cappello, pruinoso all'apice, fibrilloso-striato nella parte inferiore, biancastro e tormentoso alla base.

Carne con odore e sapore non significativi.

Microscopia. Spore eterodiametriche, con 7-8 lati, di 8.6-(9.73)-11.1 x 5.3-(6.29)-7.2 μ , con Q: 1.41-(1.55)-1.79; basidi clavati, tetrasporici, presenti GaF; cheilocistidi cilindrici o sublageniformi, talora subcapitulati; ife della cuticola strette, pigmento debolmente incrostante.