

SCHEDA N° 0585 AMS_PD

ORDINE Entomatales

GENERE Entoloma	SPECIE polioopus	AUTORE (Romagn.) Noordel.	
DATA DI RACCOLTA 20.08.2020	LUOGO DI RACC. San Michele	COMUNE Castelrotto	PROV. BZ
ALTITUDINE S.L.M. 1100 m	I.G.M. 027-I	RACCOGLITORE Vitaliano Milanese	

HABITAT:

<input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI	<input type="checkbox"/> ORTIE GIARDINI	<input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA
<input type="checkbox"/> TERRENO NUDO	<input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO	<input type="checkbox"/> ARENILE
<input type="checkbox"/> TORBIERA	<input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A	
<input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME	<input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO	<input checked="" type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Abete rosso con presenza di occiolo		<input type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO
<input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO	<input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO	<input checked="" type="checkbox"/> IN RADURE
<input type="checkbox"/> SU LEGNO	<input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO	DI

ESPOSIZIONE:

ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :




NOTE : Rinvenuti tre esemplari fra l'erba, lungo un sentiero.

MICROSCOPIA: Spore eterodiametriche, con 6-7 angoli, 9.7-11.0 x 6.8-8.1 μ.

BIBLIOGRAFIA : NOORDELOOS M.E. – ENTOLOMA S.L. – ED. CANDUSSO

DETERMINATORE Vitaliano Milanese

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI

 <p>CARPOFORI</p>	 <p>SPORE</p>	 <p>BASIDI</p>
 <p>PIGMENTO</p>		

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Pileo conico-campanulato, in alcuni casi con leggera depressione discale, 1.2-2 cm di diametro; cuticola poco igrofana, da radialmente fibrillosa a squamulosa, di colore bruno scuro, quasi nerastro al centro, striata per trasparenza (tempo umido) al margine; margine sottile, incurvato.

Lamelle largamente adnate, spaziate, subventricose, intervallate a lamellule; di colore biancastro, con filo integro di colore brunastro.

Stipite slanciato, cilindrico, flessuoso; colore da grigio-bluastro a grigio acciaio, più chiaro alla base che si presenta biancastra e tomentosa.

Carne concolore, leggermente più chiara; odore e sapore non significativi.

Microscopia. Spore eterodiametriche, con 6-7 angoli, di 9.7- (10.64)-12.4 x 6.8-(7.24)-8.1 μ , con Q: 1.35-(1.47)-1.74; basidi clavati, tetrasporici; pigmento intracellulare scuro.