

SCHEDA N° 0595 AMS_PD
ORDINE Tricholomatales

GENERE <i>Fayodia</i>	SPECIE <i>pseudoclusilis</i>	AUTORE (Joss. & Konrad) Singer	
DATA DI RACCOLTA 29.11.2020	LUOGO DI RACC. Villa de Cumani	COMUNE Sant'Elena	PROV. PD
ALTITUDINE S.L.M. 12 m	I.G.M. 168-IV	RACCOGLITORE Vitaliano Milanese	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☒ ORTIE GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI Fiume	☐ LUOGO BRUCIATO	☐ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Misto a prevalenza latifoglie in parco cittadino		☐ RADO ☐ FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	☒ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☒ OMBROSA ☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : Carpino, Acero, Cedro.





NOTE : Rinvenuto un gruppetti di una decina di esemplari.

MICROSCOPIA: Spore lungamente ellissoidali, guttulate, 5.5-8.0 x 3.3-3.9 µ.

BIBLIOGRAFIA : BREITENBACH J., KRANZLIN F. – FUNGI OF SWITZERLAND (3)

DETERMINATORE Vitaliano Milanese

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☐ FRESCHI ☒ SECCHI

CARPOFORI

SPORE

BASIDI E BASIDIOLI

GAF

PIGMENTO

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Pileo da convesso a piano-depresso, in qualche esemplare ombelicato, di circa 3-4 cm di diametro; superficie liscia, satinata, di colore grigio-bruno, più scuro nella regione discale; margine ricurvo.

Lamelle da adnate a subdecorrenti, alternate a poche lamellule, di colore biancastro.

Stipite cilindrico, in alcuni esemplari ricurvo; biancastro, ma con fibrille longitudinali concolori al cappello.

Microscopia. Spore lungamente ellissoidali, guttulate, debolmente verrucose, di $5.5-(6.76)-8.0 \times 3.3-(3.55)-3.9 \mu$, con Q: $1.61-(1.91)-2.29$; basidi lungamente clavati, tetrasporici, $28-29 \times 5.6-5.8 \mu$; epicute con ife a pigmento debolmente incrostante, presenti GaF.