

SCHEDA N° 0665 AMS_PD
ORDINE Cortinariales

GENERE <i>Galerina</i>	SPECIE <i>uncialis</i>	AUTORE (Britzelm.) Kühner	
DATA DI RACCOLTA 28.11.2021	LUOGO DI RACC. Bosco Nordio	COMUNE S.Anna di Chioggia	PROV. VE
ALTITUDINE S.L.M. 0.5 m	I.G.M. 169-I	RACCOGLITORE Vitaliano Milanese	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTIE GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☒ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI Fiume	☐ LUOGO BRUCIATO	☐ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Leccio e Pino a due aghi		☒ RADO ☐ FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☒ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☒ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☒ MOLTO UMIDO ☐ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO






VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :
NOTE : Rinvenuti due esemplari isolati, tra il muschio di una spianata.

MICROSCOPIA: Spore lungamente ellissoidali (alcune con estremità rastremata), 7.2-8.6 x 4.2-5.3 µ.

BIBLIOGRAFIA : BREITENBACH J., KRANZLIN F. – FUNGI OF SWITZERLAND (5)

DETERMINATORE Vitaliano Milanese

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☐ FRESCHI ☒ SECCHI

CARPOFORI

SPORE

SPORE [MELZER]

CISTIDI

BASIDI

STIPITE [GAF]

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Pileo da emisferico a campanulato, di circa 1.5 cm di diametro; viscido (tempo umido), debolmente striato al margine; di colore bruno-rossastro, più scuro al disco.

Imenio con lamelle annesse al gambo, intercalate a lamellule; di colore grigio-ocraceo.

Stipite cilindrico, flessuoso, di colore ocraceo nella regione sottoanulare, con elementi fibrillosi, chiaro e pruinoso all'apice.

Carne ocracea, fragile; odore debolmente farinaceo.

Microscopia Spore ellissoidali, debolmente verrucose, con plaga ilare e talora con episporio evidente, di $7.9\text{--}(8.81)\text{--}9.9 \times 5.0\text{--}(5.49)\text{--}6.0 \mu$, con Q: $1.46\text{--}(1.59)\text{--}1.77$; basidi cilindrico-clavati, $27.0\text{--}30.0 \times 7.0\text{--}7.5 \mu$; cheilocistidi lungamente lagenifomi; pleurocistidi assenti; presenti GaF sia nella corteccia pileale che (più piccoli) in quelle stipitale.