

SCHEDA N° 0740 AMS_PD
ORDINE Cantharellales

GENERE Gomphus	SPECIE clavatus	AUTORE (Pers.) Gray	
DATA DI RACCOLTA 07.08.2019	LUOGO DI RACC. Boiola	COMUNE Primiero S. Martino	PROV. TN
ALTITUDINE S.L.M. 800	I.G.M. 062-I	RACCOGLITORE Franco Manganelli	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTIE GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI Fiume	☐ LUOGO BRUCIATO	☒ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Abete rosso misto a Faggio		☒ RADO ☐ FITTO
☒ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☒ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : Diversi cespugli di Biancospino.

NOTE : Ritrovati diversi esemplari in vari stadi di sviluppo su terreno nudo.

MICROSCOPIA: Spore lungamente ellissoidali, quasi cilindriche, 9.1-10.4 x 4.7-5.6 µm.




BIBLIOGRAFIA : PAPETTI C., CONSIGLIO G. SIMONINI G. – ATL. FOTOGRAFICO DI FUNGHI D'ITALIA (1)

DETERMINATORE Franco Manganelli

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☒ FRESCHI ☐ SECCHI

CARPOFORI

CARPOFORI (DETTAGLIO)

CARPOFORO

SPORE

SPORE

BASIDI

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Carpoforo claviforme o a spatola, a volte turbinato, con superficie superiormente appianata, a volte connato; inizialmente lilla-violetto, poi con sfumature ocracee che possono interessare tutto il fungo.

Imenio con venature o rugosità con andamento sinuoso su quasi tutta la lunghezza del carpoforo.

Gambo che è il prolungamento dell'imenio verso la base, caratterizzato dall'assenza della rugosità (liscio), da concolore a quasi biancastro.

Carne assai abbondante; inizialmente soda, poi molle, bianca; odore molto debole, fungino, gradevole; sapore leggermente amarognolo.

Microscopia. Spore lungamente elissoidali, quasi cilindriche, di $9.1-10.4 \times 4.7-5.6 \mu\text{m}$; grossolanamente verrucose.