

SCHEDA N° 0620 AMS_PD

ORDINE Boletales

GENERE Gyroporus	SPECIE castaneus	AUTORE (Bull.) Quéf.	
DATA DI RACCOLTA 01.08.2020	LUOGO DI RACC. Val Canali	COMUNE Primiero S. Martino	PROV. TN
ALTITUDINE S.L.M. 1200 m	I.G.M. 062-IV	RACCOGLITORE Franco Manganelli	

HABITAT:

<input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI	<input type="checkbox"/> ORTIE GIARDINI	<input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA
<input type="checkbox"/> TERRENO NUDO	<input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO	<input type="checkbox"/> ARENILE
<input type="checkbox"/> TORBIERA	<input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A	
<input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME	<input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO	<input checked="" type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Latifoglie e conifere		<input checked="" type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO
<input checked="" type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO	<input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO	<input type="checkbox"/> IN RADURE
<input type="checkbox"/> SU LEGNO	<input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO	DI

ESPOSIZIONE:

ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: Arbusti diversi



NOTE: Rinvenuti due esemplari.

MICROSCOPIA: Spore ellissoidali, lisce, guttulate, 7.6-9.3 x 5.3-6.0 µ.

BIBLIOGRAFIA: PAPETTI C., CONSIGLIO G., SIMONINI G. – ATL. FOTOGRAFICO DEI FUNGHI D'ITALIA (1)

DETERMINATORE Franco Manganelli

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI

 <p>CARPOFORO</p>	 <p>CARPOFORO (DETTAGLI)</p>	 <p>IMENOFORO</p>
 <p>TRAMA</p>	 <p>SPORE</p>	 <p>BASIDI</p>

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Cappello di circa 6 cm di diametro, quasi spianato, con orlo leggermente ondulato; di colore bruno ruggine, con orlo leggermente più chiaro; superficie cuticolare leggermente vellutata

Tubuli arrotondati e quasi liberi al gambo; colore dei tubuli bianco crema, poi giallastri per maturazione delle spore; pori concolori ai tubuli e molto piccoli e rotondi.

Gambo quasi cilindrico, non molto lungo, spesso incurvato ed allargato verso la base, leggermente più chiaro del cappello, immutabile al tocco.

Carne soda e compatta nel giovane, poi molle nel cappello e cavernosa nel gambo, immutabile, caratteristica è la parte corticale del gambo; sapore ed odore non significativi.

Microscopia. Spore ellissoidali, lisce, guttulate, di 7.6-(8.71)-9.3 x 5.3-(5.61)-6.0 μ .