

SCHEDA N° 0771 AMS_PD
ORDINE Cortinariales

GENERE Hebeloma	SPECIE bulbiferum	AUTORE Maire 1937	
DATA DI RACCOLTA 10.11.2023	LUOGO DI RACC. Bosco Nordio	COMUNE S. Anna di Chioggia	PROV. VE
ALTITUDINE S.L.M. 1.2 m	I.G.M. 169-I	RACCOGLITORE Vitaliano Milanese	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTIE GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☒ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI Fiume	☐ LUOGO BRUCIATO	☐ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Leccio (prevalente), Carpino, qualche Pino sp.		☒ RADO ☐ FITTO
☒ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☒ OMBROSA ☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO




VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :
NOTE : Rinvenuta una decina di esemplari in una schiarita.

MICROSCOPIA: Spore amigdaliformi, finemente verrucose, destrinoidi, 9.7-11.9 x 5.9-7.0 µ.

BIBLIOGRAFIA : GRILLI E., BEKER H.J., EBERHARDT U., SCHUTZ N. – HEBELOMA SUPPLEMENT

DETERMINATORE Vitaliano Milanese

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☐ FRESCHI ☒ SECCHI

CARPOFORI

SPORE

BASIDI

CHEILOCISTITIDI

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Cappello da subgloboso a convesso, con margine involuto e basso umbone, di circa 3-4 cm di diametro negli esemplari più grandi; cuticola viscida, fortemente igrofana, di colore ocraceo, biancastra al margine (presenza di velo).

Imenio con lamelle appena smarginate, alternate a brevi lamellule, sinuose, di colore crema chiaro.

Gambo cilindrico, con evidente bulbo basale, dotato di rizoidi; biancastro, ocraceo nella regione inferiore, con debole squamettatura estesa su tutta la lunghezza.

Carne di colore biancastro; odore rafanoide, sapore amaro.

Microscopia. Spore amigdaliformi, finemente verrucose, destrinoidi, di 9.7-(10.62)-11.9 x 5.9-(6.48)-7.0 μ , Q: 1.52-(1.64)-1.75; basidi cilindrico-clavati, tetrasporici; cheilocistidi subcilindrici.