



SCHEDA N° 0646 AMS_PD

ORDINE Cortinariales

GENERE Hebeloma	SPECIE laterinum	AUTORE (Batsch) Vesterh.
DATA DI RACCOLTA 20.10.2020	LUOGO DI RACC. Cadoneghe	COMUNE Cadoneghe Prov. PD
ALTITUDINE S.L.M. 12 m	I.G.M. 126-II	RACCOGLITORE Vitaliano Milanese
HABITAT:		
☐ PRATI ERBOSI	☑ ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI FIUME	☐ LUOGO BRUCIATO	☐ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI:		☐ RADO ☐ FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	□ vivo □ morto	DI
ESPOSIZIONE:	☐ ASSOLATA ☐	OMBROSA MEDIA
UMIDITA' DEL TERRENO VEGETAZIONE CIRCOSTANTE:	☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO	UMIDO 🗵 UMIDO 🔲 ASCIUTTO 🔲 SECCO
Note: Rinvenuta una decina di esemplari sotto Aghifoglia.		
MICROSCOPIA: Spore amigdaliformi, finemente verrucose, destrinoidi, 8.8-10.7 x 5.4-6.4 μ.		
Bibliografia : Grilli E., Beker H.J., Eberhardt U., Schutz N. – Hebeloma Supplement		
DETERMINATORE Vitaliano Milanese		
RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI		
CARPOFORI	SPORE	BASIDI
CHEROCISTIDI		





DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Cappello da subgloboso a convesso, con margine involuto, di circa 4-5 cm di diametro negli esemplari più grandi; glabro, di colore brunastro, più chiaro al margine, sul cui bordo appare brevemente rugoloso e parzialmente ricoperto da pruina; residui velari assenti.

Imenio con lamelle appena smarginate, alternate a lamellule, di colore crema chiaro.

Gambo cilindrico-clavato, con bulbo basale un po' radicante; biancastro, quindi a tratti color crema scuro, da pruinoso a fibrilloso; privo di anello.

Carne biancastra, debolmente imbrunente alla base; odore non particolarmente significativo.

Microscopia. Spore amigdaliformi, finemente verrucose, destrinoidi, di 8.8-(9.66)- 10.7×5.4 -(5.97)- 6.4μ , Q: 1..48-(1.62)-1.82; basidi clavati, tetrasporici; cheilocistidi subcilindrici, raramente settati.