

SCHEDA N° 0587 AMS_PD
ORDINE Cortinariales

GENERE Hebeloma	SPECIE nauseosum	AUTORE Sacc.	
DATA DI RACCOLTA 14.11.2020	LUOGO DI RACC. Oasi di Rubano	COMUNE Rubano	PROV. PD
ALTITUDINE S.L.M. 12 m	I.G.M. 126-II	RACCOGLITORE Nadia Oprandi	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☒ ORTIE GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI Fiume	☐ LUOGO BRUCIATO	☐ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI:		☐ RADO ☐ FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☒ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO




VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :
NOTE : Rinvenuta una decina di esemplari sotto Carpino.

MICROSCOPIA: Spore da largamente amigdaliformi a citriformi, finemente verrucose, 10.7-12.7 x 6.8-8.0 µ.

BIBLIOGRAFIA : GRILLI E., BEKER H.J., EBERHARDT U., SCHUTZ N. – HEBELOMA SUPPLEMENT

DETERMINATORE Nadia Oprandi

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☐ FRESCHI ☒ SECCHI

CARPOFORI

SPORE

BASIDI

CISTIDI

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Cappello convesso, spesso lobato, con ampio umbone ottuso; glabro, di colore ocre pallido, più scuro nella regione discale; orlo sottile, privo di residui velari.

Imenio con lamelle adnate, ventricose, alternate a lamellule, ocre pallido; filo lamellare fimbriato.

Gambo cilindrico, con bulbo basale contenuto; biancastro, bruniccio alla base, pruinoso all'apice, fibrilloso verso la base.

Carne biancastra, imbrunente alla base; odore chiaramente dolciastro.

Microscopia. Spore da largamente amigdaliformi a citriformi, finemente verrucose, destrinoidi, di 10.7-(11.31)-12.7 x 6.8-(7.5)-8.0 μ , Q: 1.42-(1.55)-1.61; basidi clavati, tetrasporici; cheilocistidi polimorfi (in maggioranza clavato-stipitati), 15.8-(39.4)-56.5 x 4.5-(8.1)-12.3 μ .