

SCHEDA N° 0678 AMS_PD
ORDINE Cortinariales

GENERE <i>Hebeloma</i>	SPECIE <i>populinum</i>	AUTORE Romagn.	
DATA DI RACCOLTA 11.10.2019	LUOGO DI RACC. Pramena	COMUNE Brez	PROV. TN
ALTITUDINE S.L.M. 1200 m	I.G.M. 026-III	RACCOGLITORE Giorgio Bortoletto	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI Fiume	☐ LUOGO BRUCIATO	☐ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Latifolia (Pioppi) mista a Aghifolia		☒ RADO ☐ FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☒ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :
NOTE : Rinvenuta una decina di esemplari sotto piccoli Pioppi; esposizione a Sud-Est, vicino a una cava di ghiaia.

MICROSCOPIA: Spore largamente amigdaliformi, finemente verrucose, talora caliptrate, 10.2-11.5 x 6.0-7.8 µ.


BIBLIOGRAFIA : CONSIGLIO G., PAPETTI C. – ATL. FOTOGRAFICO DEI FUNGHI D'ITALIA (3)

DETERMINATORE Giorgio Bortoletto

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☐ FRESCHI ☒ SECCHI

CARPOFORI

SPORE

BASIDI

CHEILOCISTIDI

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Cappello da emisferico a convesso, con ampio umbone ottuso; glabro, viscoso (tempo umido), ocraceo, con macule brunastre.

Imenio con lamelle adnato-smarginate, ventricose, alternate a lamellule, ocracee, macchiate di bruno; filo lamellare biancastro.

Gambo cilindrico; biancastro, brunastro alla base, squamettato all'apice, fibrilloso verso la base.

Carne biancastra, un po' imbrunente alla base; fibrosa; odore debole, sapore amaro.

Microscopia. Spore largamente amigdaliformi, finemente verrucose, talora caliptrate, debolmente destrinoidi, di 10.2-(10.63)-11.5 x 6.0-(6.64)-7.8 μ , con Q: 1.36-(1.61)-1.79; basidi tetrasporici; cheilocistidi cilindrici, un per lo più leggermente allargati all'apice.