

SCHEDA N° 0648 AMS_PD
ORDINE Tricholomatales

GENERE Hohenbuchelia	SPECIE geogenia	AUTORE (DC.) Singer	
DATA DI RACCOLTA 30.09.2021	LUOGO DIRACC. Padova	COMUNE Padova	PROV. PD
ALTITUDINE S.L.M. 15 m	I.G.M. 126-II	RACCOGLITORE A. Zannini - E. Cantarello	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☒ ORTIE GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI Fiume	☐ LUOGO BRUCIATO	☐ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI:		☐ RADO ☐ FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☒ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :
NOTE : Rinvenuti gruppi di esemplari sia isolati che fascicolati.



MICROSCOPIA: Spore ovoidali, 7.4-8.0 x 5.0-5.8 µ.

BIBLIOGRAFIA : BREITENBACH J., KRANZLIN F. – FUNGI OF SWITZERLAND (3)

DETERMINATORE A. Zannini - E. Cantarello

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☐ FRESCHI ☒ SECCHI

CARPOFORI

LAMELLE

CISTIDI

IFE E GAF EPICUTE

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Pileo petaliforme-spatoliforme, con profonda depressione laterale; superficie da feltrata a un po' vischiosa (umidità); di colore bruno-grigiastro; margine involuto.

Lamelle fortemente decorrenti, fitte, di colore bianco sfumato di ocraceo.

Stipite breve, da eccentrico a laterale; di colore bianco sporco, poco feltrato.

Microscopia. Spore ovoidali di 7.4-8.0 x 5.0-5.8 μ , con Q: 1.22-1.45; cistidi fusiformi, a parete spessa, solo talora (funghi vecchi) con incrostazioni, di 80.0-87.0 μ di lunghezza; giunti a fibbia presenti su (quasi) tutte le giunzioni ifali.

Nota. Secondo ISF coinciderebbe con *H. petaloides*.