

SCHEDA N° 0643 AMS_PD
ORDINE Tricholomales

GENERE Hygrocybe	SPECIE aurantiolutescens	AUTORE P.D. Orton	
DATA DI RACCOLTA 11.08.2021	LUOGO DI RACC. Castelrotto	COMUNE Castelrotto	PROV. BZ
ALTITUDINE S.L.M. 1000 m	I.G.M. 027-I	RACCOGLITORE Vitaliano Milanese	

HABITAT:

☒ PRATI ERBOSI	☐ ORTIE GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI Fiume	☐ LUOGO BRUCIATO	☐ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI:		☐ RADO ☐ FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☒ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☐ UMIDO ☒ ASCIUTTO ☐ SECCO



VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :
NOTE : Ritrovati cinquei esemplari gregari vicino al bordo di un sentiero.

MICROSCOPIA: Spore da lungamente ellissoidali a subcilindriche, talora con strozzatura centrale, 10.0-12.5 x 5.5-7.9 µ.

BIBLIOGRAFIA : MOSER M., GUIDA ALLA DETERMINAZIONE DEI FUNGHI

DETERMINATORE Vitaliano Milanese

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☐ FRESCHI ☒ SECCHI

CARPOFORI

SPORE

BASIDI

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Pileo da conico-campanulato a disteso, di circa 3 cm negli esemplari più grandi, lobato, con piccolo umbone; cuticola viscida, di colore giallo arancio.

Lamelle arrotondato-sublibere, intercalate a brevi lamellule; di colore iniziale giallo, quindi progressivamente aranciate; filo irregolare, giallo pallido.

Stipite cilindrico, talora canalicolato, con lunghe fibrille, da giallo a giallo-arancio (nella parte superiore), biancastro alla base (leggermente ingrigente con il tempo).

Carne fibrosa, gialla nella metà superiore, biancastra inferiormente; in qualche esemplare appena un po' ingrigente alla base.

Microscopia. Spore da lungamente ellissoidali a subcilindriche, talora con strozzatura centrale, lisce, di 10.0-(11.3)-12.5 x 5.5-(6.47)-7.9 μ , con Q: 1.54-1.93; basidi lungamente clavati, bi- e tetrasporici.