

SCHEDA N° 0655 AMS_PD
ORDINE Tricholomales

GENERE <i>Hygrocybe</i>	SPECIE <i>fornicata</i>	AUTORE (Fr.) Singer	
DATA DI RACCOLTA 26.09.2021	LUOGO DI RACC. Monte Avena	COMUNE Pedavena	PROV. BL
ALTITUDINE S.L.M. 1300 m	I.G.M. 062-III	RACCOGLITORE Carlo Montagna	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTIE GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI Fiume	☐ LUOGO BRUCIATO	☒ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Misto con prevalenza di aghifoglia		☐ RADO ☐ FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☒ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☒ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO



VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :
NOTE : Rinvenuti tre esemplari vicini tra loro.

MICROSCOPIA: Spore da ellissoidali a ovoidali, talora con strozzatura centrale, 5.9-7.5 x 3.8-4.3 µ.

BIBLIOGRAFIA : BREITENBACH J., KRANZLIN F., FUNGI OF SWITZERLAND (3)

DETERMINATORE Vitaliano Milanese

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☐ FRESCHI ☒ SECCHI

CARPOFORI

SPORE

BASIDI

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Pileo da convesso-campanulato a disteso con ampio umbone ottuso, di circa 4-5 cm negli esemplari più grandi, fessurato e lobato; cuticola asciutta, di colore ocraceo, più chiaro al margine.

Lamelle adnato-smarginate, ventricose, spaziate, intercalate a lamellule; spesse, biancastre.

Stipite cilindrico, robusto, sericeo, con fibrille longitudinali, di colore biancastro sfumato di oca alla base.

Carne biancastra; senza odore o sapore particolari.

Microscopia. Spore da ellissoidali a ovoidali, talora con strozzatura centrale, lisce, con guttula centrale e apicolo evidente, di $5.9-(6.51)-7.5 \times 3.8-(3.92)-4.3 \mu$, con Q: $1.44-(1.66)-1.91$; basidi lungamente clavati.