

SCHEDA N° 0658 AMS_PD
ORDINE Tricholomatales

GENERE Hygrophorus	SPECIE latitabundus	AUTORE Britzelm.	
DATA DI RACCOLTA 05.11.2021	LUOGO DIRACC. Bosco dell'orna	COMUNE Coredò	PROV. TN
ALTITUDINE S.L.M. 750 m	I.G.M. 026-III	RACCOGLITORE Giorgio Bortoletto	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTIE GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI Fiume	☐ LUOGO BRUCIATO	☐ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Misto (termofilo) con molti Pini		☒ RADO ☐ FITTO
☒ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☒ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: Pini.

NOTE: Rinvenuti su un costone orientato a Sud-Est.


MICROSCOPIA: Spore ellissoidali, lisce, con apicolo, 7.2-10.7 x 5.1-7.6 µ.

BIBLIOGRAFIA: GALLI R. – GLI IGROFORI

DETERMINATORE Giorgio Bortoletto

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☐ FRESCHI ☒ SECCHI

CARPOFORO

STIPITE (ZONA ANULARE)

SPORE

BASIDI

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Pileo da convesso ad appianato, 5 cm di diametro, con largo ambone; orlo involuto, eccedente; cuticola vischioso-glutinosa, di colore grigio-olivastro.

Lamelle da adnate a subdecurrenti, spesse, spaziate, con lamellule; di colore biancastro.

Stipite cilindrico, leggermente arcuato; glutinoso, apice fioccoso, zona sovra-anulare ben delimitata; di colore bianco, con zebraure glutinose brunastre.

Carne piuttosto spugnosa, bianca, con odore e sapore non significativi.

Microscopia. Spore ellissoidali, lisce, con apicolo, di $7.2-(8.89)-10.7 \times 5.1-(6.28)-7.6 \mu$, con Q: $1.15-(1.42)-1.59$; basidi tetrasporici, lungamente clavati, presenti GaF.