



SCHEDA N° 0758 AMS_PD

ORDINE Tricholomatales

GENERE Hygrophorus	SPECIE pustulatus	AUTORE (Pers.) Fr. 1838
DATA DI RACCOLTA 12.10.2023	LUOGO DI RACC. Pian Cansiglio	COMUNE Tambre PROV. BL
ALTITUDINE S.L.M. 1100 m	I.G.M. 064-IV	RACCOGLITORE Vitaliano Milanese
HABITAT:		
☐ PRATI ERBOSI	ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
TERRENO NUDO	TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
ARGINE DI FIUME	LUOGO BRUCIATO	BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Abete rosso, Abete bia	nco e Faggio	□ FITTO
DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	□ vivo □ morto i	DI
ESPOSIZIONE:	☐ ASSOLATA ☐ OMBRO	SA MEDIA
UMIDITA' DEL TERRENO		
Note: Rinvenuti numerosi esemplari in uno spiazzo sotto Abeti.		
MICROSCOPIA: Spore irregolari, lisce, con apicolo, 7.7-9.6 x 4.6-6.4 μ.		
BIBLIOGRAFIA: PAPETTI C., CONSIGLIO G., SIMONINI G. – ATL. FOTOGRAFICO DEI FUNGHI D'ITALIA (1)		
DETERMINATORE Vitaliano Milanese RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☐ FRESCHI ☒ SECCHI		
CARPOFORI	SPORE	BASIDI
		1





DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Pileo convesso, di 2-4 cm di diametro, con papilla centrale; cuticola grigio-brunastra, più scura al centro, inizialmente debolmente vischiosa; orlo sottile, che evidenzia le lamelle sottostanti.

Lamelle arcuato-decorrenti, spaziate, intercalate a lamellule, di colore biancastro.

Stipite cilindrico, leggermente flessuoso, talora un po' ricurvo alla base; di colore biancastro, ricoperto da squamule grigio-brunastre.

Carne biancastra, debolmente grigiastra nella regione prossima alla corteccia; odore e sapore non significativi.

Microscopia. Spore irregolari, lisce, con apicolo, di 7.7-(8.52)-9.6 x 4.6-(5.34)-6.4 μ , con Q: 1.44-(1.6)-1.78; basidi tetrasporici, lungamente cilindriformi.