

**SCHEDA N° 0625 AMS\_PD**

**ORDINE Cortinariales**

<b>GENERE</b> <i>Inocybe</i>	<b>SPECIE</b> <i>grammata</i>	<b>AUTORE</b> Quél.	
<b>DATA DI RACCOLTA</b> 26.07.2020	<b>LUOGO DI RACC.</b> Monte Bedolè	<b>COMUNE</b> Transacqua	<b>PROV.</b> TN
<b>ALTITUDINE S.L.M.</b> 1000 m	<b>I.G.M.</b> 062-IV	<b>RACCOGLITORE</b> Franco Manganelli	

**HABITAT:**

<input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI	<input type="checkbox"/> ORTIE GIARDINI	<input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA
<input type="checkbox"/> TERRENO NUDO	<input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO	<input type="checkbox"/> ARENILE
<input type="checkbox"/> TORBIERA	<input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A	
<input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME	<input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO	<input checked="" type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO
<b>BOSCO DI:</b> Abete rosso		<input checked="" type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO
<input checked="" type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO	<input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO	<input type="checkbox"/> IN RADURE
<input type="checkbox"/> SU LEGNO	<input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO	DI

**ESPOSIZIONE:**

ASSOLATA       OMBROSA       MEDIA

**UMIDITA' DEL TERRENO**

ACQUITRINOSO     MOLTO UMIDO     UMIDO     ASCIUTTO     SECCO

**VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :**

**NOTE :** Rinvenuti su lettiera di aghi.

**MICROSCOPIA:** Spore gibbose, lisce, 7.8-9.4 x 5.0-5.8 µ.

**BIBLIOGRAFIA :** CONSIGLIO G., PAPETTI C. – ATL. FOTOGRAFICO DEI FUNGHID'ITALIA (2)

**DETERMINATORE** Franco Manganelli

**RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI**     FRESCHI     SECCHI




CARPOFORI




CARPOFORI



LAMELLE



SPORE



CISTIDI

**DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)**

**Cappello** di 2 cm di diametro o meno, brunastro-ocra pallido; convesso, campanulato, con leggero umbone ottuso leggermente più chiaro; orlo del cappello leggermente involuto; rivestimento liscio, sericeo o leggermente fibrilloso, con sfumatura rosata al bordo.

**Lamelle** da smarginate ad adnate, leggermente ventricose, più chiare del cappello.

**Gambo** slanciato, cilindrico, con bulbo marginato (a volte) molto evidente; ricoperto da pruina bianca.

**Carne** sottile, sfumata di rosa, con odore spermatico o acidulo.

**Microscopia.** Spore gibbose, lisce, di 7.8-(8.44)-9.4 x 5.0-(5.36)-5.8  $\mu$ , con Q: 1,41-(1.58)-1,77; cheilocistidi largamente fusiformi, musicati, metuloidi, 56.0-62.5 x 19.0-22.5  $\mu$ . Sporata color tabacco.