

SCHEDA N° 0627 AMS_PD

ORDINE Cortinariales

GENERE <i>Inocybe</i>	SPECIE <i>hirtella</i>	AUTORE Bres.	
DATA DI RACCOLTA 13.11.2016	LUOGO DI RACC. Sito Moretto	COMUNE Montegrotto Terme	PROV. PD
ALTITUDINE S.L.M. 200 m	I.G.M. 147-IV	RACCOGLITORE Vitaliano Milanese	

HABITAT:

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI | <input type="checkbox"/> ORTIE GIARDINI | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |

BOSCO DI: Latifoglia e qualche raro Pino

RADO FITTO

- | | | |
|---|--|------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input type="checkbox"/> IN RADURE |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO | <input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO | DI |

ESPOSIZIONE: ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :

NOTE : Rinvenuta una decina di esemplari gragari.

MICROSCOPIA: Spore ellissoidali, talora appressate su un estremo, lisce, 7.7-9.5 x 4.8-5.6 µ.


BIBLIOGRAFIA : BREITENBACH J., KRANZLIN F. – FUNGI OF SWITZERLAND (5)

DETERMINATORE Vitaliano Milanese


RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI




CARPOFORI



SPORE




BASIDI



CHEILOCISTIDI



CAULOCISTIDI APICALI



CAULOCISTIDI MEDIANI

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Pileo da conico ad appianato, con umbone, di circa 3-4 cm. di diametro; cuticola fibrillosa e desquamata specie nella regione periferica, di colore bruno-beige su fondo chiaro.

Lamelle debolmente smarginate, biancastre.

Stipite cilindrico, un po' ingrossato alla base; colore biancastro, sfumato di ocra; pruinoso su tutta l'estensione.

Carne color crema; odore poco rilevante, sapore analogo.

Microscopia. Spore ellissoidali, talora appressate su un estremo, lisce, parete spessa, di 7.7-(8.41)-9.5 x 4.8-(5.17)-5.6 μ , con Q: 1.53-(1.63)-1.76; osservati basidi bisporici; cheilocistidi da fusiformi a lageniformi, a parete spessa, muricati, 62.0-79.0 x 13.0-8.0 μ ; caulocistidi presenti nei 2/3 superiori dello stipite.