

**SCHEDA N° 0756 AMS\_PD**

**ORDINE Cortinariales**

<b>GENERE</b> <i>Inocybe</i>	<b>SPECIE</b> <i>terrigena</i>	<b>AUTORE (Fr.)</b> Kühner 1953	
<b>DATA DI RACCOLTA</b> 10.08.2023	<b>LUOGO DI RACC.</b> San Michele	<b>COMUNE</b> Castelrotto	<b>PROV.</b> BZ
<b>ALTITUDINE S.L.M.</b> 1200 m	<b>I.G.M.</b> 027-I	<b>RACCOGLITORE</b> Vitaliano Milanese	

**HABITAT:**

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI                | <input type="checkbox"/> ORTIE GIARDINI                      | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA                              |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO                | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO                    | <input type="checkbox"/> ARENILE  |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA                    | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A                 |   |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME             | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO                      | <input checked="" type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO                     |
| <b>BOSCO DI:</b> Abete rosso (prevalente) e Pino sp. |  | <input checked="" type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO |
| <input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO             | <input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO                | <input checked="" type="checkbox"/> IN RADURE                           |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO                    | <input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO | DI  |

**ESPOSIZIONE:**

- ASSOLATA       OMBROSA       MEDIA

**UMIDITA' DEL TERRENO**

- ACQUITRINOSO     MOLTO UMIDO     UMIDO     ASCIUTTO     SECCO

**VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :**



**NOTE :** Rinvenuti numerosi esemplari sul bordo di una spianata in un bosco di Abete rosso.

**MICROSCOPIA:** Spore da ellissoidali a subfaseoliformi, lisce, con grossa guttula centrale, 8.7-10.2 x 4.7-6.7 µ.

**BIBLIOGRAFIA :** BREITENBACH J., KRANZLIN F. -FUNGI OF SWITZERLAND (5)

**DETERMINATORE** Vitaliano Milanese

**RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI**     FRESCHI     SECCHI

 <p><b>CARPOFORI</b></p>	 <p><b>SPORE</b></p>	 <p><b>BASIDI</b></p>
 <p><b>CHEILO</b></p>		

## DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

**Pileo** subgloboso, di circa 3 cm di diametro; superficie squamulosa, di color brunastro, con fibrille nella regione periferica; margine involuto, con residui di velo.

**Lamelle** smarginate, giallastre (funghi giovani), con filo lamellare eroso, più chiaro.

**Stipite** cilindrico, leggermente allargato alla base (inglobante detriti vegetali), ricoperto da squame nella regione sotto anulare; di colore giallastro con squame brunastre; anello evidente, persistente, squamettato nella faccia inferiore.

**Carne** giallastra, consistente; odore terroso.

**Microscopia.** Spore da ellissoidali a subfaseoliformi, lisce, a parete spessa, talora con grossa guttula centrale, di 8.7-(9.35)-10.2 x 4.7-(5.96)-6.7  $\mu$ , con Q: 1.31-(1.58)-1.84; basidi lungamente cilindrici, bi e tetrasporici; cheilocistidi piriformi e clavati.