

SCHEDA N° 0601 AMS_PD
ORDINE Hymenochaetales

GENERE <i>Inonotus</i>	SPECIE <i>hispidus</i>	AUTORE (Bull.) P. Karst.	
DATA DI RACCOLTA 15.09.2016	LUOGO DI RACC. Viola	COMUNE Ceva	PROV. CN
ALTITUDINE S.L.M. 400 m	I.G.M. 228-IV	RACCOGLITORE Marco Sandri	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☒ ORTIE GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI Fiume	☐ LUOGO BRUCIATO	☐ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI:		☐ RADO ☐ FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☒ SU LEGNO	☒ VIVO ☐ MORTO	DI Melo

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☒ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☐ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO


VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :
NOTE : Rinvenuti due esemplari isolati su un tronco di Melo.

MICROSCOPIA: Spore subglobose, di colore ruggine in massa, di circa 8.5 x 6.5 µ.

BIBLIOGRAFIA : BREITENBACH J. KRANZLIN F. – FUNGI OF SWITZERLAND (2)

DETERMINATORE Marco Sandri

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☐ FRESCHI ☒ SECCHI

 CARPOFORI	 SPORE	

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Pileo mensoliforme, a forma di ventaglio, coperto da setole rigide di colore giallo ruggine, bruno-arancio o marrone vivo, diventa scuro con la maturazione; tuboli di lunghezza dai 2 ai 3 cm, con pori di colore giallo ruggine o bruni.

Carne spugnosa e fibrosa, colore da giallo fino ad arrivare a marron scuro con la maturazione; l'essiccata si sfalda facilmente.

Microscopia. Spore subglobose, di colore ruggine in massa, di circa $8.5 \times 6.5 \mu$, con Q: 1.35.