

SCHEDA N° 0583 AMS_PD

ORDINE Tricholomatales

GENERE Laccaria	SPECIE impolita	AUTORE Vellinga & G.M. Muell.	
DATA DI RACCOLTA 15.11.2020	LUOGO DI RACC. Porto Caleri	COMUNE Rosolina	PROV. RO
ALTITUDINE S.L.M. 1 m	I.G.M. 169-I	RACCOGLITORE Vitaliano Milanese	

HABITAT:

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI | <input type="checkbox"/> ORTIE GIARDINI | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input checked="" type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |
| BOSCO DI: Leccio e Pino a due aghi | | <input type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO |
| <input checked="" type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input type="checkbox"/> IN RADURE |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO | <input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO | DI |

ESPOSIZIONE:

- ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

- ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : Pino a due aghi.



NOTE : Rinvenuti in un sentiero sabbioso.

MICROSCOPIA: Spore subglobose, aculeate, a base larga, 8.2-9.8 x 7.6-8.8 µ.

BIBLIOGRAFIA : CHIAVE A.M.B. MUGGIA

DETERMINATORE Vitaliano Milanese

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI

 <p style="text-align: center;">CARPOFORI</p>	 <p style="text-align: center;">SPORE</p>	 <p style="text-align: center;">BASIDI</p>

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Pileo da emisferico a appianato, con leggera depressione centrale, di 2-3 cm di diametro negli esemplari più grandi, con margine sottile, ondulato e irregolare, appena un po' striato al margine negli esemplari vecchi (affatto in quelli giovani); cuticola di colore bruno aranciato, finemente squamulosa.

Lamelle da adnate a subdecorrenti, intercalate a lamellule, spaziate, larghe, biancastre; filo lamellare irregolare.

Stipite cilindrico, slanciato, flessuoso nella parte inferiore; con colore al cappello, con fibrille biancastre, al pari della regione basale.

Carne fibrosa, con odore e sapore non significativi.

Microscopia. Spore subglobose, aculeate, con aculei a base larga, di 8.2-(8.92)-9.8 x 7.6-(8.01)-8.8 μ , con Q: 1.04-(1.12)-1.22; basidi clavati, bi e trisporici.