

SCHEDA N° 0614 AMS_PD

ORDINE Russulales

GENERE Lactarius	SPECIE deterrimus	AUTORE Gröger	
DATA DI RACCOLTA 04.08.2020	LUOGO DI RACC. Stiozze	COMUNE Primiero S. Martino	PROV. TN
ALTITUDINE S.L.M. 1200 m	I.G.M. 062-IV	RACCOGLITORE Franco Manganelli	

HABITAT:

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI | <input type="checkbox"/> ORTIE GIARDINI | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input checked="" type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |
| BOSCO DI: Abete rosso | | <input checked="" type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO |
| <input checked="" type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input type="checkbox"/> IN RADURE |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO | <input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO | DI |

ESPOSIZIONE:

- ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

- ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :




NOTE :

MICROSCOPIA: Spore subglobose, verruche unite da creste sottili in reticoli incompleti, 6.8-8.2 x 6.3-7.4 µ.

BIBLIOGRAFIA : PAPETTI C., CONSIGLIO G., SIMONINI G. – ATL. FOTOGRAFICO DEI FUNGHI D'ITALIA (1)

DETERMINATORE Franco Manganelli

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI

 <p>CARPOFORI</p>	 <p>CARPOFORI (IMENOFORO)</p>	 <p>SPORE</p>
 <p>BASIDI</p>		

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Cappello di 5-6 cm di diametro; convesso, poi spianato e leggermente depresso, arancio vivo, verdeggiante con l'età; margine arrotondato, poco o nulla zonato, pruinoso rugoloso.

Lamelle adnato-decorrenti, molto fitte, oca-aranciate, si macchiano di verde nelle fratture.

Gambo farcito, poi cavo, concolore al cappello; non scrobicolato e pruinoso.

Carne crema-arancio; vira al rosso vinoso lentamente, poi al verde scuro; lattice abbondante, color arancio, vira al vinoso dopo un po' di tempo.

Microscopia. Spore subglobose, con verruche unite da creste sottili in reticoli incompleti, di 6.8-(7.39)-8.2 x 6.3-(6.75)-7.4 μ , con Q: 1.01-(1.09)-1.23.