

SCHEDA N° 0561 AMS_PD

ORDINE Russulales

GENERE Lactarius	SPECIE lignyotus	AUTORE Fr.	
DATA DI RACCOLTA 13.07.2020	LUOGO DI RACC. Lago di Calaita	COMUNE Canal San Bovo	PROV. TN
ALTITUDINE S.L.M. 1600 m	I.G.M. 062-IV	RACCOGLITORE Vitaliano Milanese	

HABITAT:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI | <input type="checkbox"/> ORTIE GIARDINI | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input checked="" type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |

BOSCO DI: **Abete rosso e Faggio**

- RADO FITTO
 IN RADURE

- | | | |
|---|--|------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input type="checkbox"/> IN RADURE |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO | <input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO | DI |

ESPOSIZIONE: ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : **Abete rosso.**

NOTE : **Rinvenuti tre esemplari isolati.**

MICROSCOPIA: **Spore subglobose, cretato-reticolate, a reticoli completi, 8,4-9,7 x 7,5-9,2 µ.**


BIBLIOGRAFIA : **KRANZLIN F. – FUNGI OF SWITZERLAND (6)**

DETERMINATORE **Vitaliano Milanese**

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



CARPOFORI



SPORE



EPICUTE

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Pileo piano-convesso con piccolo umbone, di circa 4 cm di diametro; margine sottile, incurvato verso il basso; superficie vellutata, di colore bruno-nerastro.

Imenoforo a lamelle poco fitte, decorrenti, intercalate a lamellule, di colore biancastro; filo intero, con colore; lattice bianco.

Stipite cilindrico, slanciato, segnato dalle lamelle nell'estrema parte superiore; concolore al cappello, biancastro alla base.

Carne inizialmente soda, quindi spugnosa, biancastra; odore e sapore non significativi.

Microscopia. Spore subglobose, cretato-reticolate, con creste alte unite in reticoli completi, di 8.4-(9.08)-9.7 x 7.5-(8.29)-9.2 μ , con Q: 1.02-(1.09)-1.16; macrocistidi non rilevati; epicute formata da cellule vescicolose intercalate a elementi terminali subcilindrici.