

SCHEDA N° 0714 AMS_PD

ORDINE Russulales

| | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| GENERE Lactarius | SPECIE salmonicolor | AUTORE R. Heim & Leclair | |
| DATA DI RACCOLTA 17.08.2022 | LUOGO DI RACC. Val Mesta | COMUNE Primiero S. Martino | PROV. TN |
| ALTITUDINE S.L.M. 1250 m | I.G.M. 062-I | RACCOGLITORE Franco Manganelli | |

HABITAT:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI | <input type="checkbox"/> ORTIE GIARDINI | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input checked="" type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |

BOSCO DI: **Conifera con Abete bianco**

RADO FITTO

- | | | |
|---|--|------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input type="checkbox"/> IN RADURE |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO | <input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO | DI |

ESPOSIZIONE: ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :

NOTE : **Rinvenuti diversi esemplari tra aghi e muschio.**

MICROSCOPIA: **Spore quasi ellissoidali, 7,3-9,6 x 6,3-7,6 µm.**

BIBLIOGRAFIA: **CONSIGLIO G., PAPETTI C. – ATL. FOTOGRAFICO DEI FUNGHI D'ITALIA (2)**

DETERMINATORE **Franco Manganelli**

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI




CARPOFORI




CARPOFORI



BASIDI



SPORE



SPORE

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Cappello di 7-8 cm di diametro, disteso, con leggera depressione centrale; rivestimento brillante di colore giallo-arancio con zonature concentriche non molto evidenti.

Lamelle da adnate a quasi decorrenti, fitte, arancio salmone, rossastre nelle fratture; lattice abbondante, arancio carota che vira lentamente al rossastro vinoso.

Gambo cilindrico, leggermente attenuato alla base, concolore al cappello, con piccoli scrobicoli.

Carne soda, di colore crema fino ad arancio pallido che al taglio vira all'arancio-rossastro nella corteccia del gambo e verso l'inserzione delle lamelle; odore leggero e sapore mite.

Microscopia. Spore quasi ellissoidali, di 7.3-9.6 x 6.3-7.6 μm ; cistidi fusoidi; sporata beige-rosato pallido.

Note. Assenza di toni verdastri sul carpoforo.