

SCHEDA N° 0739 AMS_PD

ORDINE Agaricales

GENERE <i>Lepiota</i>	SPECIE <i>clypeolaria</i>	AUTORE (Bull.) P. Kumm.	
DATA DI RACCOLTA 01.10.2018	LUOGO DI RACC. Prati S. Giovanni	COMUNE Mezzano	PROV. TN
ALTITUDINE S.L.M. 1100	I.G.M. 062-I	RACCOGLITORE Franco Manganelli	

HABITAT:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI | <input type="checkbox"/> ORTIE GIARDINI | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input checked="" type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |

BOSCO DI: **Faggi con Abete rosso**

RADO FITTO

- | | | |
|---|--|------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input type="checkbox"/> IN RADURE |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO | <input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO | DI |

ESPOSIZIONE: ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : **Diversi cespugli di latifoglie.**

NOTE :

MICROSCOPIA: **Spore subellittiche o subfusiformi con depressione sopra ilare, 12.0-16.2 x 5.0-6.5 µm.**

BIBLIOGRAFIA : **PAPETTI C., CONSIGLIO G. SIMONINI G. – ATL. FOTOGRAFICO DI FUNGHI D'ITALIA (1) CANDUSSO, LANZONI- LEPIOTE**

DETERMINATORE **Franco Manganelli**


RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI




CARPOFORI



CARPOFORI



CHEILOCISTIDI



SPORE



SPORE X1000

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Cappello globoso-campanulato con umbone ottuso; bruno ocraceo al disco, altrove dissociato in squame concentriche brune.

Lamelle non molto fitte, con inserimento a collarino; filo leggermente denticolato, viranti al giallognolo allo sfregamento.

Gambo cilindrico; leggermente attenuato in alto, fistoloso-fioccoso al di sotto della zona anulare che a volte è molto evidente.

Carne bianca, nella parte cuticolare del gambo giallastra; odore leggero di lepiota cristata, sapore poco gradevole.

Microscopia. Spore subellittiche o subfusiformi con depressione sopra ilare, 12.0-16.2 x 5.0-6.5 μm ; cheilocistidi ventricosi, qualcuno globoso o subgloboso; polvere sporale biancastra.