



## SCHEDA N° 0660 AMS\_PD

## ORDINE Tricholomatales

GENERE Lepista	SPECIE sordida var. umbonata	AUTORE (Bon) Bon	
DATA DI RACCOLTA 19.11.2021	LUOGO DI RACC. Contrada Bonati	COMUNE Schio	Prov. VI
ALTITUDINE S.L.M. 500 m	I.G.M. 103-IV	RACCOGLITORE Enrica Mi	lanese
HABITAT:			
PRATI ERBOSI	ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRAI	)A
TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE	
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A		
ARGINE DI FIUME	LUOGO BRUCIATO	BOSCO SUBALPINO	_
BOSCO DI: Latifoglia mista		⊠ RADO	☐ FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO		
☐ SU LEGNO	□ vivo □ morto	DI	
ESPOSIZIONE:	☐ ASSOLATA ☐ OMBR	OSA MEDIA	
UMIDITA' DEL TERRENO VEGETAZIONE CIRCOSTANTE:	☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO	□ MIDO    □ ASCIUTI	o  secco
Note: Rinvenuti numerosi esen	nplari vicini.		
	idali, verrucose, 6.2-7.1 x 4.2-4.7 μ.		
	IGLIO G., SIMONINI G., ATL. FOTOGRAFI	CO DEI FUNGHI D'ITALIA (1)	
DETERMINATORE Vitaliano Milar	nese	UATI SU REPERTI	⊠ secchi
CARPOFORI	SPORE		BASIDIOLI





## **DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)**

**Pileo** spianato, con spiccato umbone centrale, di circa 5 cm di diametro; cuticola liscia, leggermente untuosa, igrofana, di colore violetto (bruno-violetto nella regione discale); orlo involuto, sottile.

Lamelle adnato-smarginate, parzialmente subdecorrenti, intercalate a numerose lamellule; di colore grigio-violetto.

**Stipite** cilindrico, un po' tortuoso alla base, pieno tendente a farcito; corteccia fibrillosa, di colore bruno-violetto, con evidenti striature longitudinali; presenza di feltro miceliare biancastro alla base.

Carne piuttosto tenace, fibrosa nello stipite, di colore grigio-lilla; odore non particolarmente sgradevole, sapore dolciastro.

**Microscopia.** Spore ellittico-ovoidali, verrucose, di 6.2-(6.62)- $7.1 \times 4.2$ -(4.52)- $4.7 \mu$ , con Q: 1.36-(1.46)-1.63; basidi tetrasporici, clavati; epicute a ife cilindriche, irregolarmente intrecciate, presenti giunti a fibbia.