

SCHEDA N° 0774 AMS_PD
ORDINE Agaricales

GENERE Leucoagaricus	SPECIE ariminensis	AUTORE Dovana, Angeli, Contu & Brandi	
DATA DI RACCOLTA 10.11.2023	LUOGO DI RACC. Bosco Nordio	COMUNE S.Anna di Chioggia	PROV. VE
ALTITUDINE S.L.M. 1.5 m	I.G.M. 169-I	RACCOGLITORE Vitaliano Milanese	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTIE GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☒ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI Fiume	☐ LUOGO BRUCIATO	☐ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Leccio (prevalente), Pino a due aghi, Pioppo		☐ RADO ☒ FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	☒ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☒ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :
NOTE : Rinvenuti alcuni esemplari infossati in un sentiero sabbioso.





MICROSCOPIA: Spore da subamigdaliformi a ellissoidali, guttulate, 6.6-8.0 x 4.0-4.9 µ.

BIBLIOGRAFIA : DOVANA F. & AL. – LEUCOAGARICUS ARIMINENSIS SP. NOV., A LILAC SPECIE FROM ITALY – MYCOTAXON 2017

DETERMINATORE Vitaliano Milanese

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☒ FRESCHI ☐ SECCHI

CARPOFORI

CARPOFORO (SEZIONE)

SPORE

SPORE (DESTRINOIDIA)

SPORE (METACROMASIA)

CHEILOCISTIDI

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Pileo da convesso a piano convesso, appianato al centro, di circa 4 cm di diametro nell'esemplare più grande (funghi giovani); cuticola bruno-rossastra, tormentosa, tendente a desquamarsi al bordo.

Lamelle libere, con collarium, arcuate, non molto fitte, intercalate a lamellule; di colore crema, tendente all'ocraceo con l'essiccazione.

Stipite cilindrico, fistoloso, incurvato alla base, dove si dilata in modo consistente, dotato di anello supero; biancastro e fibrilloso nella parte superiore, da biancastro a brunastro verso la base.

Microscopia. Spore da subamigdaliformi a (talora) ellissoidali, lisce, guttulate, di $6.6-(7.29)-8.0 \times 4.0-(4.38)-4.9 \mu$, con Q: $1.56-(1.67)-1.76$, destrinoidi, apicolate; basidi tetrasporici, $21.0-28.0 \times 7.0-8.5 \mu$; cheilocistidi da cilindrico-clavati a lageniformi; giunti a fibbia assenti.