

SCHEDA N° 0768 AMS_PD

ORDINE Agaricales

GENERE Leucoagaricus	SPECIE subvolvatus	AUTORE (Malençon & Bertault) Bon 1977	
DATA DI RACCOLTA 10.11.2023	LUOGO DI RACC. Bosco Nordio	COMUNE S.Anna di Chioggia	PROV. VE
ALTITUDINE S.L.M. 1 m	I.G.M. 169-I	RACCOGLITORE Vitaliano Milanese	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI

☐ ORTIE GIARDINI

☐ MARGINI DI STRADA

☐ TERRENO NUDO

☒ TERRENO SABBIOSO

☐ ARENILE

☐ TORBIERA

☐ TERRENO COLTIVATO A

☐ ARGINE DI Fiume

☐ LUOGO BRUCIATO

☐ BOSCO SUBALPINO

BOSCO DI: **Latifoglia (prevalentemente Leccio)**

☒ RADO
 ☐ FITTO

☐ DENTRO AL BOSCO

☐ AI MARGINI DEL BOSCO

☒ IN RADURE

☐ SU LEGNO

☐ VIVO

☐ MORTO

DI

ESPOSIZIONE:

☐ ASSOLATA
 ☐ OMBROSA
 ☒ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

☐ ACQUITRINOSO
 ☐ MOLTO UMIDO
 ☒ UMIDO
 ☐ ASCIUTTO
 ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :



NOTE : **Rinvenuti numerosi esemplari isolati.**

MICROSCOPIA: **Spore subvoidali, dotate di apicolo, destrinoidi, 6.4-8.4 x 4.8-6.0 µ.**

BIBLIOGRAFIA : **CANDUSSO M., LANZONI G. – FUNGI EUROPAEI: LEPIOTA S.L.**

DETERMINATORE **Vitaliano Milanese**

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI
☐ FRESCHI
 ☒ SECCHI

 CARPOFORI	 SPORE	 SPORE (BLU CRESILE)

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Pileo da convesso a piano; rivestimento liscio, di colore bianco, talora sfumato di crema nella zona discale; margine sottile.

Lamelle fitte, libere, ventricose, alternate a lamellule; da bianche a crema.

Stipite cavo, allargato alla base; superficie sericea, concolore al cappello, anello supero; presente un bulbo molto evidente.

Microscopia. Spore subvoidali, dotate di apicolo, destrinoidi, di $6.4-(7.4)-8.4 \times 4.8-(5.5)-6.0 \mu$, con Q: 1.15-(1.35)-1.5.