

SCHEDA N° 0637 AMS_PD
ORDINE Tricholomatales

GENERE <i>Melanoleuca</i>	SPECIE <i>cognata</i>	AUTORE (Fr.) Konrad & Maubl.	
DATA DI RACCOLTA 08.06.2021	LUOGO DI RACC. Brez	COMUNE Brez	PROV. TN
ALTITUDINE S.L.M. 1300 m	I.G.M. 026-III	RACCOGLITORE Giorgio Bortoletto	

HABITAT:

☒ PRATI ERBOSI	☐ ORTIE GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI Fiume	☐ LUOGO BRUCIATO	☐ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI :		☐ RADO ☐ FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☒ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☐ UMIDO ☒ ASCIUTTO ☐ SECCO




VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :
NOTE : Rinvenuti due gruppi di esemplari in prossimità di una malga.

MICROSCOPIA: Spore ellissoidali, verrucose, 7.0-8.7 x 4.3-5.7 µ.

BIBLIOGRAFIA : CONSIGLIO G., PAPETTI C. – ATL. FOTOGRAFICO DEI FUNGHI D'ITALIA (2)

DETERMINATORE Giorgio Bortoletto

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☐ FRESCHI ☒ SECCHI

CARPOFORI

SPORE

BASIDI

CISTIDI

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Pileo da convesso a pulvinato, dotato di basso umbone, di circa 8 cm. di diametro negli esemplari più grandi; cuticola liscia, opaca, pruinosa, di colore caffelatte, più scura (argilla) al disco.

Lamelle adnato-smarginate, alternate a lamellule; colore crema-ocraceo; filo ondulato, appena leggermente crenulato.

Stipite cilindrico, leggermente ingrossato alla base; fibrilloso, scanalato verso la base; concolore al cappello, con pruina all'apice.

Carne spugnosa, biancastra, tendente a scurire in prossimità della corteccia e sopra le lamelle.

Microscopia. Spore ellissoidali, verrucose, con guttula centrale, di 7.0-(8.05)-8.7 x 4.3-(5.38)-5.7 μ , con Q: 1,31-(1.51)-1,8; basidi tetrasporici, clavati; cistidi leggermente lageniformi, talora con setto, ad apice incrostato.