

SCHEMA N° 0556 AMS_PD
ORDINE Tricholomatales

GENERE Melanoleuca	SPECIE rasilis var. leucophylloides	AUTORE Bon	
DATA DI RACCOLTA 13.11.2018	LUOGO DIRACC. Cadoneghe	COMUNE Padova	PROV. PD
ALTITUDINE S.L.M. 12 m	I.G.M. 126-II	RACCOLTITORE Vitaliano Milanese	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☒ ORTIE GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI Fiume	☐ LUOGO BRUCIATO	☐ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI:		☐ RADO ☐ FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☒ MEDIA


UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO


VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :
NOTE :
MICROSCOPIA: Spore ellissoidali, verrucose, guttulate, con apicolo, 7.4-8.4 x 5.3-6.3 µ.

BIBLIOGRAFIA : BON M. – FLORE MYCOLOGIQUE D'EUROPE (2) – TRICHOLOMES

DETERMINATORE Vitaliano Milanese

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☐ FRESCHI ☒ SECCHI

CARPOFORI

SPORE

BASIDI

CISTIDI

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Pileo da convesso a piano-depresso, con piccolo umbone, di circa 5-6 cm di diametro; cuticola glabra, di colore bruno-ocraceo, più scura (bruno nerastra) al disco; orlo sottile, biancastro.

Lamelle da adnate a subdecorrenti con dentino, alternate a lamellule di diversa lunghezza; colore biancastro con riflessi crema.

Stipite cilindrico, leggermente ingrossato alla base; biancastro, percorso da striature longitudinali concolori al cappello.

Carne fibrosa, biancastra, progressivamente iscrentesi a partire dalla base.

Microscopia. Spore ellissoidali, verrucose, apicolate, guttulate, di 7.4-(7.94)-8.4 x 5.3-(5.68)-6.3 μ , con 1.26-(1.4)-1.58; basidi tetrasporici, clavati, 33.0-345.0 x 8.3-9.5 μ ; cistidi a pelo d'ortica 34-41 x 6.6-6.9 μ .

Nota. Nome corrente secondo ISF *M. leucophylloides*