



SCHEDA N° 0630 AMS_PD

ORDINE Tricholomatales

DATA DI RACCOLTA 13.11.2018	SPECIE rasilis	AUTORE (Fr.) Singer
	LUOGO DI RACC. Cadoneghe	COMUNE Padova PROV. PD
ALTITUDINE S.L.M. 12 m	I.G.M. 126-II	RACCOGLITORE Marco Sandri
HABITAT: PRATI ERBOSI	☐ ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI FIUME	LUOGO BRUCIATO	☐ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI:		☐ RADO ☐ FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
□ SU LEGNO	□ vivo □ morto	DI
ESPOSIZIONE:	☐ ASSOLATA ☐ OM	BROSA MEDIA
UMIDITA' DEL TERRENO VEGETAZIONE CIRCOSTANTE:	☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMI	DO MUMIDO ASCIUTTO SECCO
Note:		
MICROSCOPIA: Spore ellissoidali	, a verruche isolate, 5.9-7.1 x 4.5-5.6 μ	l.
BIBLIOGRAFIA: BON M FLORE	MYCOLOGIQUE D'EUROPE (2) – TRICHO	DLOMES
DETERMINATORE Vitaliano Mila	nese	
	RIEB VI EFFE	TTUATI SU REPERTI
CARPOFORI	SPORE	CISTIDI





DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Pileo da convesso fino a piano-depresso, con piccolo umbone, di circa 5 cm di diametro; cuticola glabra, igrofana, di colore grigio-bruno, più scura nella regione discale; orlo sottile, con epicute un leggermente eccedente.

Lamelle smarginate, intercalate a lamellule; di colore da biancastro a grigio-brunastro, con filo localmente fioccoso.

Stipite cilindrico, pieno, concolore al cappello, con fibrille longitudinali, fioccoso specie nella parte apicale.

Carne fibrosa, biancastra, ma progressivamente iscurentesi a partire dalla base.

Microscopia. Spore ellissoidali, a verruche isolate, di 5.9-(6.34)-7.1 x 4.5-(4.89)-5.6 μ , con Q: 1.13-(1.31)-1.4; basidi tetrasporici; cistidi a pelo d'ortica, scarsamente muricati, 25.5-35.5 x 5.0-7.5 μ .