

SCHEDA N° 0582 AMS_PD
ORDINE Tricholomatales

GENERE Micromphale	SPECIE brassicolens	AUTORE (Romagn.) P.D. Orton	
DATA DI RACCOLTA 09.10.2020	LUOGO DI RACC. Bosco Nordio	COMUNE S.Anna di Chioggia	PROV. VE
ALTITUDINE S.L.M. 1.5 m	I.G.M. 169-I	RACCOGLITORE Vitaliano Milanese	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☒ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI Fiume	☐ LUOGO BRUCIATO	☐ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Leccio e Pino a due aghi.		☐ RADO ☐ FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☒ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO


VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :
NOTE : Rinvenute colonie numerose, su residui legnosi insabbiati.

MICROSCOPIA: Spore da lungamente ellissoidali a larmiformi, 4.4-5.8 x 3.1-4.3 µ.

BIBLIOGRAFIA : BREITENBACH J., KRANZLIN F. – FUNGI OF SWITZERLAND (3)

DETERMINATORE Vitaliano Milanese

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☐ FRESCHI ☒ SECCHI

CARPOFORI

SPORE

BASIDI

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Pileo da convesso ad appianato, di circa 2 cm di diametro; cuticola lubrificata, igrifera, di colore da bruno fulvo a ocre pallido/bianco sporco; margine molto irregolare, ondulato, sottile, biancastro.

Lamelle adnato-smarginate, relativamente spaziate, con lamellule; colore da biancastro a crema pallido.

Stipite cilindrico, talora leggermente allargato alla base, vellutato; di colore bruno-nerastro, con sfumature rosso cupo nella regione apicale.

Carne biancastra, scarsa, con odore di cavolo marcio.

Microscopia. Spore da lungamente ellissoidali a larmiformi, lisce, di 4.4-(4.94)-5.8 x 3.1-(3.39)-4.3 μ , con Q: 1.35-(1.46)-1.67; basidi da cilindrici a lungamente clavati, tetrasporici, con GaF poco distinti, 25-28 x 4.8-5 μ ; cheilocistidi irregolari.

Nome corrente ISF: *Gymnopus brassicolens*