

SCHEDA N° 0645 AMS_PD
ORDINE Tricholomatales

GENERE Micromphale	SPECIE perforans	AUTORE (Hoffm.) Gray	
DATA DI RACCOLTA 14.06.2014	LUOGO DI RACC. Cansiglio	COMUNE Tambre	PROV. BL
ALTITUDINE S.L.M. 900 m	I.G.M. 064-IV	RACCOGLITORE Vitaliano Milanese	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTIE GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI FIUME	☐ LUOGO BRUCIATO	☒ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Misto di aghifoglia e aghifoglia		☒ RADO ☐ FITTO
☒ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☒ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO




VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :
NOTE : Rinvenuta una decina di esemplari su aghi di Abete.

MICROSCOPIA: Spore lacrimoidi, lisce, 6.5-7.9 x 3.1-4.0 µ.

BIBLIOGRAFIA : BREITENBACH J., KRANZLIN F. – FUNGI OF SWITZERLAND (3)

DETERMINATORE Vitaliano Milanese

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☐ FRESCHI ☒ SECCHI

CARPOFORI

SPORE

CISTIDI

EPICUTE

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Pileo piano (funghi adulti), di circa 1.5 cm di diametro, con leggera depressione centrale; cuticola lubrificata, di colore brunastro, più chiara al centro (tempo asciutto), radicalmente striata; margine sottile.

Lamelle adnate, spaziate, con lamellule; di colore crema.

Stipite cilindrico, vellutato; di colore bruno-nerastro (più chiaro all'apice), con isolate e diffuse squamette chiare.

Carne scarsa, con odore sgradevole.

Microscopia. Spore lacrimoidi, lisce, ialine, di $6.5-(7.0)-7.9 \times 3.1-(3.7)-4.0 \mu$, con Q: 1.67-2.11; basidi lungamente clavati; cistidi cilindrici, dotati di GaF; rivestimento dell'epicute formato da ife cilindriche, talora ramificate.