

SCHEDA N° 0592 AMS_PD
ORDINE Tricholomatales

GENERE <i>Mycena</i>	SPECIE <i>inclinata f. albopileata</i>	AUTORE Derbsch & J. Aug. Schmitt	
DATA DI RACCOLTA 18.11.2018	LUOGO DIRACC. Sito Moretto	COMUNE Montegrotto Terme	PROV. PD
ALTITUDINE S.L.M. 150 m	I.G.M. 147-IV	RACCOGLITORE Vitaliano Milanese	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTIE E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI Fiume	☐ LUOGO BRUCIATO	☐ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Quercia, Castagno, Robinia		☒ RADO ☐ FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	☒ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☒ SU LEGNO	☐ VIVO ☒ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☒ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO



VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :
NOTE : Rinvenuti 2 gruppi di esemplari fascicolati.

MICROSCOPIA: Spore largamente ellissoidali, 7.5-8.7 x 5.8-7.0 µ.

BIBLIOGRAFIA : ROBICH G. – MYCENA D'EUROPA – A.M.B.

DETERMINATORE Vitaliano Milanese

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☐ FRESCHI ☒ SECCHI

CARPOFORI

SPORE

BASIDI

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Pileo da campanulato a piano-convesso, di 2-2.5 cm di diametro, in qualche esemplare con umbone; cuticola appena un po' igrofana, striata per trasparenza, biancastra (appena tendente all'ocra pallido al disco).

Imenoforo a lamelle adnate, alternate a brevi lamellule; da biancastre a sfumate di bruno-giallastro a partire dal bordo pileale.

Stipite cilindrico, slanciato, incurvato, liscio, un po' allargato alla base; di colore biancastro nella parte superiore, grigio brunastro alla base, ricoperta da peluria biancastra.

Carne sottile, acquosa, grigio pallido, con odore rafanoide.

Microscopia. Spore largamente ellissoidali, ialine, di $7.5-(8.09)-8.7 \times 5.8-(6.47)-7.0 \mu$, con Q: 1.16-(1.25)-1.34; basidi cilindrico-clavati, tetrasporici, $30.0-35.0 \times 7.0-8.0 \mu$, dotati di GaF.