



SCHEDA N° 0670 AMS_PD

ORDINE Tricholomatales

GENERE Mycena	SPECIE olida	AUTORE Bres.	
DATA DI RACCOLTA 30.12.2021	LUOGO DI RACC. Proto Caleri	COMUNE Rosolina	Prov. RO
ALTITUDINE S.L.M. 1 m	I.G.M. 169-I	RACCOGLITORE Vitaliano M	nanese
HABITAT:			
☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA	L Company
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE	
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A		
ARGINE DI FIUME	LUOGO BRUCIATO	□ BOSCO SUBALPINO	П
BOSCO DI: Bosco litoraneo di Pin	no e Leccio (prevalenti)	☐ RADO	☐ FITTO
DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE	
SU LEGNO	□ VIVO □ MORTO	DI Latifoglia	
ESPOSIZIONE:	☐ ASSOLATA ☐ OM	BROSA MEDIA	
UMIDITA' DEL TERRENO			
Note: Rinvenuti numerosi esemplari su residui legnosi a terra (rametti, cortecce).			
MICROSCOPIA: Spore largamente ellittico-ellissoidali, apicolate, non amiloidi, 6.7-8.3 x 4.6-6.0 μ.			
BIBLIOGRAFIA: ROBICH GMYCENA D'EUROPA			
DETERMINATORE Vitaliano Milanese			
RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI SECCHI			
CARPOFORI	SPORE	TRAM	1A EPICUTE
CORTECCIA STIPITALE			





DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Pileo conico-campanulato, di circa 1 cm di diametro, striato per trasparenza; cuticola di colore da biancastro a crema pallido, bordo sottile, irregolare.

Imenoforo a lamelle ascendenti-annesse, per lo più convesse; biancastre, crema-grigiastre, con filo su tono più chiaro.

Stipite cilindrico, slanciato, pubescente; colore biancastro, con base cosparsa da peluria biancastra.

Carne sottile, con odore non significativo.

Microscopia. Spore largamente ellittico-ellissoidali, lisce, apicolate, talora con grossa guttula, non amiloidi, di $6.7-(7.41)-8.3 \times 4.6-(5.29)-6.0 \mu$, con Q: 1.21-(1.4)-1.53.