

SCHEDA N° 0778 AMS_PD

ORDINE Tricholomatales

GENERE <i>Mycena</i>	SPECIE <i>pura</i>	AUTORE (Pers.) P. Kumm. 1871	
DATA DI RACCOLTA 18.06.2023	LUOGO DI RACC. Asiago	COMUNE Asiago	PROV. VI
ALTITUDINE S.L.M. 1100 m	I.G.M. 082-II	RACCOGLITORE Vitaliano Milanese	

HABITAT:

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI | <input type="checkbox"/> ORTIE GIARDINI | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |

BOSCO DI: **Abete rosso (prevalente)**

- | | | |
|---|---|------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input type="checkbox"/> IN RADURE |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO | <input type="checkbox"/> VIVO | <input type="checkbox"/> MORTO |
| | | DI |

ESPOSIZIONE:

- | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ASSOLATA | <input checked="" type="checkbox"/> OMBROSA | <input type="checkbox"/> MEDIA |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|

UMIDITA' DEL TERRENO

- | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ACQUITRINOSO | <input type="checkbox"/> MOLTO UMIDO | <input checked="" type="checkbox"/> UMIDO | <input type="checkbox"/> ASCIUTTO | <input type="checkbox"/> SECCO |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :

NOTE : Rinvenuto un gruppo di 6-7 esemplari, alcuni concresciuti.

MICROSCOPIA: Spore cilindrico-ellissoidali, con evidente apicolo in visione laterale, guttulate, 6,4-9,5 x 3,7-4,4 µ.


BIBLIOGRAFIA : ROBICH G. – MYCENA D'EUROPA – A.M.B.

DETERMINATORE Vitaliano Milanese


RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI




CARPOFORI




SPORE



SPORE IN MELZER



CISTIDI



EPICUTE (GAF)

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Pileo piano-convesso, di circa 3.5 cm di diametro nell'esemplare maggiore; cuticola appena un po' igrofana e striata al margine (in un esemplare), margine sottile; colore bruno-violetto, più chiaro alla periferia.

Imenoforo a lamelle quasi smarginate, alternate a brevi lamellule; biancastre, con filo concolore, ventricose, anastomosate; filo eroso.

Stipite cilindrico, slanciato, liscio, cavo, allargato alla base; di colore lilla-violetto, con fibrille biancastre diffuse.

Carne sottile, con odore e sapore debolmente rafanoidi.

Microscopia. Spore cilindrico-ellissoidali, con evidente apicolo in visione laterale, ialine, guttulate, amiloidi, di $6.4\text{--}(7.96)\text{--}9.5 \times 3.7\text{--}(4.06)\text{--}4.4 \mu$, con Q: 1.55-(1.96)-2.25; basidi tetrasporici (anche bisporici), subclavati; cistidi ventricoso-fusiforimi, attestati intorno ai $63.0 \times 17.0 \mu$; epicute ad ife parallele, presenti GaF alle connessioni.