



SCHEDA N° 0732 AMS_PD

ORDINE Tricholomatales

GENERE Mycena	SPECIE vitilis	AUTORE (Fr.) Quél.
DATA DI RACCOLTA 04.11.2022	LUOGO DI RACC. Bosco Nordio	COMUNE S.Anna di Chioggia Prov. VE
ALTITUDINE S.L.M. 1.5 m	I.G.M. 169-I	RACCOGLITORE Vitaliano Milanese
HABITAT:		
☐ PRATI ERBOSI	ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
ARGINE DI FIUME	LUOGO BRUCIATO	☐ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Latifoglie (prevalente	Leccio) misto a Pino	⊠ RADO ☐ FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ vivo ☐ Morto	DI
ESPOSIZIONE:	☐ ASSOLATA 🖂 G	OMBROSA MEDIA
UMIDITA' DEL TERRENO	☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO U	
VEGETAZIONE CIRCOSTANTE:	ACQUITRINOSO MOLIO U	MIDO UMIDO ASCIOTTO SECCO
Note: Rinvenuti gruppi di esen	plari nelle fenditure di un pontile	e lacustre.
MICROSCOPIA: Spore ellittiche, gu	uttulate, lisce, debolmente amiloid	li, 8.7-10.7 x 6.2-7.4 μ.
BIBLIOGRAFIA: ROBICH GMYC	ENA D'EUROPA	·
DETERMINATORE Vitaliano Milan	ese	
DETERMENTORE VICINIO MINIS	RILIEVI EF	FFETTUATI SU REPERTI 🛛 FRESCHI 🗌 SECCHI
CARPOFORI	SPORE	CISTIDI





DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Pileo da conico-campanulato a espanso, con ampio umbone, di circa 2.5 cm di diametro negli esemplari più grandi, striato per trasparenza; cuticola ocracea, più chiara al margine, dall'aspetto untuoso; margine sottile.

Imenoforo con lamelle da ascendenti fino a decorrenti con dentino, alternate a lamellule, fortemente anastomosate; biancastre, con filo debolmente seghettato.

Stipite cilindrico, slanciato, liscio; biancastro all'apice, quindi rosa-grigiastro chiaro verso la base.

Carne sottile, con odore e sapore non significativi.

Microscopia. Spore ellittiche, guttulate, ialine, lisce, debolmente amiloidi, di 8.7-(9.52)-10.7 x 6.2-(6.7)-7.4 μ , con Q: 1.3-(1.42)-1.58; basidi clavati, tetrasporici, privi di GaF; cheilocistidi con estrusioni digitaliformi; ife dell'epicute parallele, con brevi diverticoli.