

SCHEDA N° 0688 AMS_PD

ORDINE Agaricales

GENERE Nyctalis	SPECIE asterophora	AUTORE Fr.	
DATA DI RACCOLTA 24.09.2006	LUOGO DI RACC. Borca	COMUNE Borca di Cadore	PROV. BL
ALTITUDINE S.L.M. 950 m	I.G.M. 046-I	RACCOGLITORE Alfredo Zannini	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI Fiume	☐ LUOGO BRUCIATO	☒ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Aghifoglia (Pino e Abete)		☒ RADO ☐ FITTO
☒ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:

☐ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☒ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :




NOTE : Rinvenuti su *Russula nigricans* in decomposizione.

MICROSCOPIA: Spore ellissoidali, lisce, 4.4-6.2 x 3.5-4.6 µ.

BIBLIOGRAFIA : CONSIGLIO G., PAPETTI C. – ATL. FOTOGRAFICO DEI FUNGHI D'ITALIA (2)

DETERMINATORE Vitaliano Milanese

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☒ FRESCHI ☐ SECCHI

 CARPOFORI	 SPORE	 CLAMIDOSPORE
 BASIDI		

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Pileo da emisferico a convesso a piano-convesso; cuticola asciutta, aspersa da pruina densa, da biancastra a ocracea (età).

Lamelle rade, irregolari, piuttosto spesse; di colore biancastro.

Stipite cilindraceo, inizialmente pieno (cavo negli esemplari più adulti); colore biancastro-ocraceo.

Carne esigua; odore sgradevole.

Microscopia. Spore ellissoidali, lisce, di $4.4-(4.71)-6.2 \times 3.5-(3.79)-4.6 \mu$, con Q: 1.25-(1.31)-1.37; clamidospore ovoidali, marcatamente verrucoso-spinulose, di $12.0-(14.0)-15.5 \times 10.8-(12.1)-13.2 \mu$, Q: 1.09-(1.17)-1.28; basidi clavati, tetrasporici.