

SCHEDA N° 0668 AMS_PD
ORDINE Agaricales

GENERE <i>Parasola</i>	SPECIE <i>Kuehneri</i>	AUTORE (Uljé&Bas) Redhead &Altri	
DATA DI RACCOLTA 24.08.2021	LUOGO DI RACC. Fioriera	COMUNE Padova	PROV. PD
ALTITUDINE S.L.M. 12 m	I.G.M. 0126-II	RACCOGLITORE Vitaliano Milanese	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTIE GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI Fiume	☐ LUOGO BRUCIATO	☐ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI:		☐ RADO ☐ FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☒ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☒ MOLTO UMIDO ☐ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO






VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :
NOTE : Rinvenuti 2 esemplari in una fioriera in terrazzo.

MICROSCOPIA: Spore da ellissoidali a mitriformi (poche), con poro germinativo laterale, 7.7-10.4 x 5.1-6.6 µ.

BIBLIOGRAFIA : BREITENBACH J., KRANZLIN F. – FUNGI OF SWITZERLAND (4)

DETERMINATORE Vitaliano Milanese

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☐ FRESCHI ☒ SECCHI

CARPOFORI

SPORE

BASIDI

PLEUROCISTIDI

CHEILCISTIDI

EPICUTE

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Pileo convesso, di circa 1.5 cm di diametro nell'esemplare maggiore; superficie asciutta, priva di velo, di colore bruno-rossastro, con scanalature chiare per l'intera estensione; zona discale brunastra.

Lamelle libere, nerastre (fungo maturo) e filo intero biancastro.

Stipite cilindrico, allargato alla base dove è presente un piccolo bulbo; di colore beige con fibrille biancastre.

Microscopia. Spore da ellissoidali a mitriformi (poche), con poro germinativo laterale, lisce, di 7.7-(8.74)-10.4 x 5.1-(5.83)-6.6 μ ; basidi cilindrico-clavati, tetrasporici, di 22.5-31.5 x 7.5-10.0 μ ; cheilocistidi globoso-lageniformi, 47.0-60.0 x 14.5-22.0 μ ; pleurocistidi cilindrici; cheilocistidi per lo più lageniformi, 47.0-60.0 x 14.5-22.0 μ ; nell'epicute con cellule globose; presenza di peli di dimensioni ridotte (< 150 μ) nella regione discale; presenti caulocistidi.

Nota. Secondo IFS: *Parasola kuehneri* = *Coprinus kuehneri*