

SCHEDA N° 0616 AMS_PD

ORDINE Boletales

GENERE Paxillus	SPECIE atrotomentosus	AUTORE (Batsch) Fr.	
DATA DI RACCOLTA 08.08.2020	LUOGO DI RACC. Monte Bedolè	COMUNE Primiero S. Martino	PROV. TN
ALTITUDINE S.L.M. 1200 m	I.G.M. 062-IV	RACCOGLITORE Franco Manganelli	

HABITAT:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI | <input type="checkbox"/> ORTIE GIARDINI | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input checked="" type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |

BOSCO DI: Abete rosso con qualche Faggio

- RADO FITTO
 IN RADURE

- | | | |
|---|--|------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input checked="" type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input type="checkbox"/> IN RADURE |
| <input checked="" type="checkbox"/> SU LEGNO | <input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO | DI |

ESPOSIZIONE: ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: Piccoli arbusti.

NOTE: Rinvenuti diversi esemplari su una ceppaia.

MICROSCOPIA: Spore ellissoidali, lisce, 4.8-5.6 x 3.6-4.1 µ.

BIBLIOGRAFIA: PAPETTI C., CONSIGLIO G., SIMONINI G. – ATL. FOTOGRAFICO DEI FUNGHI D'ITALIA (1)

DETERMINATORE Franco Manganelli


RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



CARPOFORI



CARPOFORI



SPORE

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Cappello di 10-12 cm di diametro, convesso, poi quasi imbutiformi, lobato, con margine fortemente involuto; superficie vellutata, di color ocre o tabacco con sfumature olivastre

Lamelle arcuate, decorrenti sul gambo; poco sviluppate in altezza, di colore giallo oliva pallido poi fulvastre, con filo bruno rossastro, separabili dal cappello.

Gambo cilindrico o con altre forme; eccentrico o addirittura laterale, infisso nel substrato; superficie vellutata, con tomento color cuoio, concolore al cappello fino a quasi l'inserzione delle lamelle.

Carne compatta e fibrillosa nel gambo; di colore biancastro o color cuoio, con odore debole e sapore astringente.

Microscopia. Spore ellissoidali, lisce, di 4.8-(5.28)-5.6 x 3.6-(3.85)-4.1 μ , con Q: 1.19-(1.37)-1.46. Sporata da bruno-ocraceo a olivastro.