

SCHEDA N° 0709 AMS_PD

ORDINE Pezizales

GENERE <i>Peziza</i>	SPECIE <i>ampelina</i>	AUTORE Pass.	
DATA DI RACCOLTA 14.03.2023	LUOGO DI RACC. Padova	COMUNE Padova	PROV. PD
ALTITUDINE S.L.M. 13 m	I.G.M. 126-II	RACCOGLITORE Giorgio Bortoletto	

HABITAT:

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI | <input type="checkbox"/> ORTIE GIARDINI | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |
| BOSCO DI: | | <input type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO |
| <input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input type="checkbox"/> IN RADURE |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO | <input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO | DI |

ESPOSIZIONE:

- ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

- ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :


NOTE : Rinvenuti tre esemplari in un vaso di fiori.

MICROSCOPIA: Spore ellissoidali, guttulate nella fase iniziale, con verruche grossolane e isolate, 15.2-19.0 x 8.4-10.4 µ.

BIBLIOGRAFIA : BREITENBACH J., KRANZLIN F. - FUNGI OF SWITZERLAND

DETERMINATORE Vitaliano Milanese

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Ascoma costituito da apotecio di 3.5 cm di diametro, in forma di coppa sessile, cupolato; imenoforo liscio, localmente ondulato, di colore bruno con toni (sfumature) bruno-violacei; superficie esterna più chiara, debolmente pruinoso.

Carne cassante, fragile, biancastra, secernente (scarso) liquido trasparente.

Microscopia. Spore ellissoidali, ialine, lisce, guttulate nella fase iniziale (due guttule relativamente grandi, accompagnate da altre minori), uniseriate nell'asco, di 20.3-(22.65)-24.0 x 12.5-(1.65)-14.0 μ , e Q: 1.49-(1.65)-1.94; aschi 8-sporici, aporinchi, cilindracei, amiloidi, 200.0-210.0 x 14.0-15.0 μ .; parafisi cilindracee, settate, allargate all'apice.