

**SCHEDA N° 0673 AMS\_PD**

**ORDINE Tricholomatales**

<b>GENERE</b> Pleurotus	<b>SPECIE</b> pulmonarius	<b>AUTORE (Fr.)</b> QuéL.	
<b>DATA DI RACCOLTA</b> 30.12.2021	<b>LUOGO DI RACC.</b> P.to Caleri	<b>COMUNE</b> Rosolina	<b>PROV.</b> RO
<b>ALTITUDINE S.L.M.</b> 1 m	<b>I.G.M.</b> 169-I	<b>RACCOGLITORE</b> Vitaliano Milanese	

**HABITAT:**

<input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI	<input type="checkbox"/> ORTIE GIARDINI	<input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA
<input type="checkbox"/> TERRENO NUDO	<input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO	<input checked="" type="checkbox"/> ARENILE
<input type="checkbox"/> TORBIERA	<input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A	<input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO
<input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME	<input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO	<input type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO
<b>BOSCO DI:</b>		
<input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO	<input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO	<input type="checkbox"/> IN RADURE
<input checked="" type="checkbox"/> SU LEGNO	<input type="checkbox"/> VIVO <input checked="" type="checkbox"/> MORTO	DI

**ESPOSIZIONE:**

ASSOLATA     OMBROSA     MEDIA

**UMIDITA' DEL TERRENO**

ACQUITRINOSO     MOLTO UMIDO     UMIDO     ASCIUTTO     SECCO

**VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :**

**NOTE :** Rinvenuti due gruppi di esemplari su legno insabbiato di (presunto) Leccio.






**MICROSCOPIA:** Spore subcilindriche, 8,3-9,4 x 3,3-4,0 µ.

**BIBLIOGRAFIA :** MOSER M. – GUIDA ALLA DETERMINAZIONE DEI FUNGHI - SATURNIA

**DETERMINATORE** Vitaliano Milanese

**RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI**     FRESCHI   

**SECCHI**

 <p><b>CARPOFORI</b></p>	 <p><b>SPORE</b></p>	 <p><b>BASIDI</b></p>
 <p><b>TRAMA LAMELLARE</b></p>	 <p><b>IFE EPICUTE</b></p>	



#### DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

**Pileo** petaloide-conchiforme; cuticola di colore bruno, con zonature e margine più scuro (umido); orlo sottile.

**Lamelle** brevemente decorrenti, da biancastre a bruno caffelatte, alternate a rade lamellule; filo regolare.

**Stipite** laterale, molto breve, di colore crema  $\pm$  carico.

**Microscopia.** Spore subcilindriche, apicolate, di 8.3-(8.84)-9.4 x 3.3-(3.64)-4.0  $\mu$ , con Q: 2.08-(2.45)-2.65; basidi cilindrici, tetrasporici; ife lamellari a bordo un po' spesso; epicute per lo più a fasci di ife parallele.