

SCHEDA N° 0692 AMS_PD

ORDINE Agaricales

GENERE Psathyrella	SPECIE candolleana	AUTORE (Fr.) Maire	
DATA DI RACCOLTA 27.09.2022	LUOGO DI RACC. San Lazzaro	COMUNE Padova	PROV. PD
ALTITUDINE S.L.M. 12 m	I.G.M. 126-II	RACCOGLITORE Vitaliano Milanese	

HABITAT:

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI | <input checked="" type="checkbox"/> ORTIE GIARDINI | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |
| BOSCO DI: | | <input type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO |
| <input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input type="checkbox"/> IN RADURE |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO | <input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO | DI |

ESPOSIZIONE:

- ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

- ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : Carpino.


NOTE : Rinvenuti numerosi esemplari lungo un vialetto.

MICROSCOPIA: Spore ellissoidali, lisce, con poro germinativo, 7.7-8.5 x 4.6-5.2 µ.

BIBLIOGRAFIA : BREITENBACH J., KRANZLIN F. – FUNGI OF SWITZERLAND (4)

DETERMINATORE Vitaliano Milanese

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Pileo da emisferico-campanulato ad appianato, con basso umbone, di circa 3-3.5 cm di diametro; superficie liscia, igrofana, biancastra, ocracea al disco; bordo sottile, fessurato, con residui velari biancastri.

Lamelle adnate, intercalate a lamellule, grigiastre con toni rosati; filo più chiaro.

Stipite cilindrico, cavo, leggermente flessuoso verso la base, base (talora) un po' ingrossata; superficie liscia, di colore bianco.

Carne biancastra, fragile nel cappello, un po' fibrosa nel gambo; odore e sapore non significativi.

Microscopia. Spore ellissoidali, lisce, con poro germinativo, $7.7-(7.98)-8.5 \times 4.6-(4.94)-5.2 \mu$, con Q: $1.47-(1.62)-1.78$; basidi clavati, tetrasporici, di circa $22 \times 9.5 \mu$; cheilocistidi da cilindrici a utriforni, $34.5-44.5 \times 9.5-12.5 \mu$; epicute costituita da elementi subsferici e piriformi, di $26.5-30 \times 21.5-28 \mu$.