

SCHEDA N° 0699 AMS_PD
ORDINE Tricholomatales

GENERE Pseudoclitocybe	SPECIE cyathiformis	AUTORE (Bull.) Singer	
DATA DI RACCOLTA 16.10.2022	LUOGO DI RACC. Cesuna	COMUNE Roana	PROV. VI
ALTITUDINE S.L.M. 1050 m	I.G.M. 082-III	RACCOGLITORE Vitaliano Milanese	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTIE GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI Fiume	☐ LUOGO BRUCIATO	☒ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Conifere (prevalenti) miste a Faggi e Noccioli		☒ RADO ☐ FITTO
☒ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☒ OMBROSA ☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO


VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :
NOTE : Rinvenuti sette esemplari lungo un sentiero.

MICROSCOPIA: Spore ellissoidali, lisce, debolmente amiloidi, 6.0-7.2 x 4.5-4.7 µ.

BIBLIOGRAFIA : PAPETTI C., CONSIGLIO G., SIMONINI G. – ATL. FOTOGRAFICO DEI FUNGHI D'ITALIA (1)

DETERMINATORE Vitaliano Milanese

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☒ FRESCHI ☐ SECCHI

CARPOFORI

SPORE

BASIDIOLI

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Pileo depresso fino a imbutiforme, di circa 5 cm di diametro nell'esemplare più grande; cuticola liscia, con deboli fibrille radiali, di colore bruno scuro con riflessi olivastri, più scura al centro; margine piuttosto sottile, da involuto a incurvato (età).

Imenoforo a lamelle adnato-decorrenti, intercalate a lamellule; di colore grigio-beige.

Stipite cilindrico, ingrossato alla base; superficie fibrillosa, di colore bruno-grigiastro.

Carne grigiastra, con odore e sapore non particolari.

Microscopia. Spore ellissoidali, lisce, debolmente amiloidi, di $6.0-(6.63)-7.2 \times 4.5-(4.62)-4.7 \mu$, con Q: $1.29-(1.44)-1.53$; basidi lungamente clavati, tetrasporici; presenti GaF.