

**SCHEDA N° 0552 AMS\_PD**

**ORDINE Clavariales**

<b>GENERE</b> <i>Ramaria</i>	<b>SPECIE</b> <i>abietina</i>	<b>AUTORE (Pers.)</b> Quéf.	
<b>DATA DI RACCOLTA</b> 20.08.2020	<b>LUOGO DI RACC.</b> S. Michele	<b>COMUNE</b> Castelrotto	<b>PROV.</b> BZ
<b>ALTITUDINE S.L.M.</b> 1100 m	<b>I.G.M.</b> 027-I	<b>RACCOGLITORE</b> Vitaliano Milanese	

**HABITAT:**

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI    | <input type="checkbox"/> ORTIE GIARDINI      | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA          |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO    | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO    | <input type="checkbox"/> ARENILE                    |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA        | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A |   |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO      | <input checked="" type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |

**BOSCO DI:** Aghifoglia (prevalente *Picea*) con qualche *Nocciolo*.

RADO  FITTO

- |   |  |                                    |
|---|--|------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO                | <input type="checkbox"/> IN RADURE |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO                   | <input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO | DI                                 |

**ESPOSIZIONE:**

- ASSOLATA  OMBROSA  MEDIA

**UMIDITA' DEL TERRENO**

- ACQUITRINOSO  MOLTO UMIDO  UMIDO  ASCIUTTO  SECCO

**VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :**


**NOTE :** Rinvenuti 5.6 esemplari alla base di un *Abete rosso*..

**MICROSCOPIA:** Spore per lo più lacrimoidi, apicolate, verrucose, 5,6)-7,5 x 3,2-4,4 µ.

**BIBLIOGRAFIA :** YOUNG A.M. – FL. MYCOL. FRANCE 1888

**DETERMINATORE** Vitaliano Milanese

**RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI**  FRESCHI  SECCHI

 <p><b>CARPOFORI</b></p>	 <p><b>SPORE</b></p>	

#### DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

**Basidiocarpo** coralloide, piuttosto esile e cespitoso, originato da una base piuttosto esigua; rami subito verticali (selle a U), terminanti in brevi tratti (da 2 a 4) appuntiti, di colore giallo ocraceo sfumato di toni verdastri.

**Carne** poco consistente, ocracea con mazzature di colore verde-bluastrò, biancastra alla base.

**Microscopia.** Spore per lo più lacrimoidi, apicolate, verrucose, di  $5.6-(6.32)-7.5 \times 3.2-(3.61)-4.4 \mu$ , con Q:  $1.68-(1.75)-1.87$ ; basidi lungamente clavati, tetrasporici, di c.a.  $30.0-33.5 \times 4.1-4.6 \mu$ .

**Osservazioni.** Le dimensioni sporiali specificate da Young (e prossime alle nostre) sono nettamente più piccole di quelle riportate in Breitenbach e altri AA.