



## SCHEDA N° 0755 AMS\_PD

## ORDINE Russulales

GENERE Russula	SPECIE adusta	AUTORE (Pers.) Fr. 1838
DATA DI RACCOLTA 10.08.2023	LUOGO DI RACC. San Michele	COMUNE Castelrotto Prov. BZ
ALTITUDINE S.L.M. 1150 m	I.G.M. 027-I	RACCOGLITORE Vitaliano Milanese
HABITAT:		
☐ PRATI ERBOSI	ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
ARGINE DI FIUME	☐ LUOGO BRUCIATO	☐ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Aghifoglia		⊠ rado ☐ fitto
DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
SU LEGNO	☐ vivo ☐ morto	DI
ESPOSIZIONE:	☐ ASSOLATA ☐ OM	BROSA MEDIA
UMIDITA' DEL TERRENO VEGETAZIONE CIRCOSTANTE:	☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UM	DO MUMIDO ASCIUTTO SECCO
Note: Rinvenuti 5-6 esemplari	vicini.	
MICROSCOPIA: Spore subglobose, con verruche connesse da bassi reticoli, 6.3-6.8 x 5.2-6.0 μ.		
Bibliografia: Kranzlin F. – Fungi of Switzerland (6)		
DETERMINATORE Vitaliano Milan	RILIEVI EFFE	TTUATI SU REPERTI 🔲 FRESCHI 🖂 SECCHI
CARPOFORI	Spore	CISTIDI
ELEMENTI EPICUTE		





## DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

**Pileo** emisferico (funghi giovani) di circa 3-5 cm di diametro, con depressione centrale; cuticola liscia, da viscida ad asciutta, non separabile, di colore crema-brunastro più scuro al centro, talora con toni bruno-rossastri; margine liscio, pallido; annerente con l'essicazione.

Lamelle adnate, intercalate a lamellule, piuttosto fragili; colore da crema pallido (iniziale) a ocraceo, che si mantiene con l'essicazione.

**Stipite** cilindrico, subclavato, piuttosto tozzo; superficie rugosa, biancastra, debolmente arrossante al tocco, con il tempo nerastra.

Carne biancastra, lentamente arrossante, quindi annerente; odore da botte, sapore poco significativo.

**Microscopia.** Spore subglobose, con verruche amiloidi, connesse da bassi reticoli, di 6.3-(6.51)-6.8 x 5.2-(5.67)-6.0  $\mu$ , con Q: 1.08-(1.15)-1.23; cistidi cilindriformi, in alcuni casi capitulati; dermatocistidi cilindrici, sottili, grigiastri in SV.