

SCHEDA N° 0597 AMS_PD
ORDINE Russulales

GENERE Russula	SPECIE albonigra f. pseudonigricans	AUTORE Romagn.	
DATA DI RACCOLTA 21.08.2012	LUOGO DI RACC. San Michele	COMUNE Castelrotto	PROV. BZ
ALTITUDINE S.L.M. 1150 m	I.G.M. 027-I	RACCOGLITORE Vitaliano Milanese	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTIE GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI Fiume	☐ LUOGO BRUCIATO	☐ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Conifere (prevalente Abete rosso)		☒ RADO ☐ FITTO
☒ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☒ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : Abete rosso, Nocciolo.




NOTE : Rinvenuti 4 esemplari isolati ma vicini.

MICROSCOPIA: Spore subvoidali, verruche fortemente amiloidi, connesse da creste sottili, 8.4-9.3 x 7.8-8.0 µ.

BIBLIOGRAFIA : SARNARI M. – IL GENERE RUSSULA IN EUROPA (1)

DETERMINATORE Vitaliano Milanese

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☐ FRESCHI ☒ SECCHI

CARPOFORI

SPORE

CISTIDI

EPICUTE

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Pileo da globoso a piano-convesso, con depressione centrale; cuticola vischiosa (tempo umido), di colore bruno-nerastro con sottostanti crema.

Imenoforo a lamelle subadnate, alternate a brevi lamellule; di colore bianco latte, quindi annerenti a partire dal bordo.

Stipite robusto, corto, pruinoso sull'intera estensione; di colore biancastro, quindi (con granulazioni) bruno-nerastro a partire dalla base, al tocco prima rosso sangue quindi nerastro.

Carne da biancastra a rosso vivo per esposizione all'aria, quindi grigio-nerastra; sapore e odore non significativi.

Microscopia. Spore subvoidali, con verruche basse fortemente amiloidi, connesse da creste sottili, di $8.4-(8.91)-9.3 \times 7.8-(7.93)-8.0 \mu$, con Q: 1.06-(1.11)-1.14; cistidi fusiformi, a contenuto oleoso; epicute costituita da elementi cilindrici, spesso ricurvi; dermatocistidi cilindrici, scarsamente colorabili in SV.