



## SCHEDA N° 0715 AMS\_PD

## ORDINE Russulales

| GENERE Russula   | SPECIE emetica           | AUTORE (Schaeff.) Pers.              |
|--|--------------------------|--------------------------------------|
| DATA DI RACCOLTA 13.08.2022  | LUOGO DI RACC. Col Perer | COMUNE Arsiè PROV. BL                |
| ALTITUDINE S.L.M. 700 m  | I.G.M. 083-IV            | RACCOGLITORE Franco Manganelli       |
| навітат:   |                          |                                      |
| ☐ PRATI ERBOSI   | ORTI E GIARDINI          | MARGINI DI STRADA                    |
| ☐ TERRENO NUDO   | ☐ TERRENO SABBIOSO       | ☐ ARENILE                            |
| ☐ TORBIERA   | ☐ TERRENO COLTIVATO A    |                                      |
| ARGINE DI FIUME  | LUOGO BRUCIATO           | BOSCO SUBALPINO  □ DURAN             |
| BOSCO DI: Abete rosso  |                          | ☐ RADO ☐ FITTO                       |
| DENTRO AL BOSCO  | ☐ AI MARGINI DEL BOSCO   | ☐ IN RADURE                          |
| SU LEGNO   | ☐ vivo ☐ morto           | DI                                   |
| ESPOSIZIONE:   | ☐ ASSOLATA ☐ OMI         | BROSA MEDIA                          |
| UMIDITA' DEL TERRENO VEGETAZIONE CIRCOSTANTE:  | ACQUITRINOSO MOLTO UMI   | DO MIDO ASCIUTTO SECCO               |
| Note:  |                          |                                      |
| MICROSCOPIA: Spore obovoidali, reticolate, 7.8-9.4 x 7.0-8.0 μm.                               |                          |                                      |
| BIBLIOGRAFIA: PAPETTI C., CONSIGLIO G., SIMONINI G. – ATL. FOTOGRAFICO DEI FUNGHI D'ITALIA (1) |                          |                                      |
| DETERMINATORE Franco Mangar  | nelli RILIEVI EFFE       | TTUATI SU REPERTI 🔲 FRESCHI 🔲 SECCHI |
| CARPOFORI  | CARPOFORI                | SPORE                                |
| 159 (1987) TO 18 (1987)  |                          |                                      |





## DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Cappello di 3-4 cm di diametro, convesso, cuticola brillante di colore rosso vivo o rosso sangue.

Lamelle arrotondate all'inserzione, rettilinee, sottili e fragili, bianche con riflesso paglierino; con qualche lamellula.

Gambo quasi cilindrico o leggermente allargato alla base; di colore bianco, con qualche riflesso giallastro.

Carne bianca, fragile, con sapore pepato in ogni parte; odore insignificante.

Microscopia. Spore obovoidali, reticolate, di 7.8-9.4 x 7.0-8.0 μm; sporata biancastra.

## Reazioni chimiche

Guaiaco quasi nullo