



SCHEDA N° 0687 AMS_PD

ORDINE Rus	ssulales
------------	----------

DATA DI DAGGOVERA 22 00 2022		•
DATA DI RACCOLTA 22.08.2022	LUOGO DI RACC. Rumo	COMUNE Rumo Prov. TN
ALTITUDINE S.L.M. 1200 m	I.G.M. 026-III	RACCOGLITORE Giorgio Bortoletto
HABITAT:		
☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
ARGINE DI FIUME	LUOGO BRUCIATO	BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Pino		☐ RADO ☐ FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	
☐ SU LEGNO	□ vivo □ morto	DI
ESPOSIZIONE:	☐ ASSOLATA ☐ OM	MBROSA MEDIA
UMIDITA' DEL TERRENO VEGETAZIONE CIRCOSTANTE:	☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UM	IDO UMIDO ASCIUTTO SECCO
Note: Rinvenuti quattro esem	plari piuttosto ravvicinati tra il musc	chio in un pianoro con esposizione a est.
MICROSCOPIA: Spore ovoidali, c	on verruche spinulose, isolate, amiloi	idi, 8.9-10.1 x 7.6-8.5 μ.
Bibliografia : Galli R. – Le Ru	SSULE	
DETERMINATORE Vitaliano Mila	noco	
L	RILIEVI EFFI	ETTUATI SU REPERTI 🔲 FRESCHI 🔀 SECCHI
	RILIEVI EFFI	ETTUATI SU REPERTI
CARPOFORI	RILIEVI EFFI	ETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI CISTIDI





DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Pileo da subgloboso a disteso con depressione centrale, di colore bruno con regione discale macchiata di ocra-giallo-olivastro; cuticola un po' vischiosa; margine sottile.

Lamelle sublibere, piuttosto larghe, forcate; colore iniziale biancastro, quindi crema-giallastro, con filo più chiaro fino a biancastro.

Stipite cilindraceo, inizialmente pieno, quindi farcito; rugoloso, di colore biancastro (macchiato di giallo-bruno con l'età).

Carne soda, biancastra; sapore dolce (nocciola).

Microscopia. Spore ovoidali, con verruche spinulose, isolate, amiloidi, di 8.9-(9.78)- 10.1×7.6 -(8.47)- 8.5μ , Q: 1.07-(1.16)-1.24; cistidi fusiformi, per lo più ottusi all'apice; ife dell'epicute cilindrico-attenuate, debolmente incrostate.