

SCHEDA N° 0628 AMS_PD

ORDINE Russulales

GENERE Russula	SPECIE nauseosa	AUTORE (Pers.) Fr.	
DATA DI RACCOLTA 24.08.2018	LUOGO DI RACC. Passo Pinei	COMUNE Catselrotto	PROV. BZ
ALTITUDINE S.L.M. 1300 m	I.G.M. 027-I	RACCOGLITORE Vitaliano Milanese	

HABITAT:

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI | <input type="checkbox"/> ORTIE GIARDINI | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input checked="" type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |
| <input type="checkbox"/> BOSCO DI: Abete rosso | | <input checked="" type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO |
| <input checked="" type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input type="checkbox"/> IN RADURE |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO | <input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO | DI |

ESPOSIZIONE:

- ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

- ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :



NOTE :

MICROSCOPIA: Spore subglobose, con verruche pressoché isolate, 7.0-7.9 x 5.5-6.7 µ.

BIBLIOGRAFIA : GALLI R. – LE RUSSULE

DETERMINATORE **Vitaliano Milanese**

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI

 <p style="text-align: center;">CARPOFORI</p>	 <p style="text-align: center;">SPORE</p>	 <p style="text-align: center;">CISTIDI</p>
 <p style="text-align: center;">DERMATOCISTIDI</p>		

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Cappello da convesso a piano-depresso, di 4 cm di diametro nell'esemplare maggiore; cuticola viscida, rosa incarnato (fungo molto bagnato), più scuro (brunastro) al centro; orlo scanalato tubercolato.

Lamelle arrotondato-libere, poco forcate, piuttosto anastomizzate, da biancastre a crema.

Gambo cilindrico, biancastro, rugoso, grigiastro nell'esemplare più adulto.

Carne biancastra; odore debole, sapore non significativo.

Microscopia. Spore subglobose, con verruche pressoché isolate, di 7.0-(7.31)-7.9 x 5.5-(5.86)-6.7 μ , con Q: 1.18-(1.25)-1.31; cistidi fusiformi, talora appendicolari.