

SCHEDA N° 0588 AMS_PD

ORDINE Russulales

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|
| GENERE Russula | SPECIE raoultii | AUTORE Quél. | |
| DATA DI RACCOLTA 09.10.2020 | LUOGO DI RACC. Arnica alta | COMUNE Castelfondo | PROV. TN |
| ALTITUDINE S.L.M. 1300 m | I.G.M. 026-III | RACCOGLITORE Giorgio Bortoletto | |

HABITAT:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI | <input type="checkbox"/> ORTIE GIARDINI | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |
| BOSCO DI: Aghifoglie | | <input checked="" type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO |
| <input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input checked="" type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input type="checkbox"/> IN RADURE |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO | <input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO | DI |

ESPOSIZIONE:

- ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

- ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : Presenza di molte felci.




NOTE : Rinvenuti due esemplari sul versante Sud-Ovest del monte.

MICROSCOPIA: Spore subglobose, verrucoso-reticolate, verruche coniche connesse da bassi reticoli, 8.1-9.1 x 6.6-7.8 µ.

BIBLIOGRAFIA : KRANZLIN F. – FUNGI OF SWITZERLAND (6) - MYCOLOGIA

DETERMINATORE Enzo Cantarello

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI

| | | |
|---|--|--|
|  <p>CARPOFORI</p> |  <p>SPORE</p> |  <p>CHELOCISTIDI</p> |
|  <p>DERMATOCISTIDI</p> |  <p>PELLICULATE</p> | |

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Pileo piano-convesso, di circa 5 cm di diametro, scanalato al margine; cuticola liscia, leggermente vischiosa, di colore bianco-giallino molto pallido, con lavature lilla.

Lamelle arrotondato-libere, spaziate, fragili, di colore bianco.

Stipite cilindrico, allargato nella regione inferiore, finemente rugoso; di colore bianco, sfumato di crema pallido verso la base.

Carne bianca, piuttosto fragile; odore non significativo, sapore un po' piccante.

Microscopia. Spore subglobose, verrucoso-reticolate, con verruche coniche, connesse da bassi reticoli, amiloidi, di $8.1-(8.83)-9.1 \times 6.6-(7.31)-7.8 \mu$, con Q: 1.13-(1.21)-1.3; basidi clavati, tetrasporici; cheilocistidi fusiformi, con appendice superiore; dermatocistidi per lo più cilindrici, in qualche caso moniliformi, grigiastri in SV; epicute con peli sottili, flessuosi, spesso ramificati.